

Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки
Кора	Побелка садовая	Обработка стволов осенью или весной до распускания почек
Кора	Садовый вар	Применение после обрезки
Зимующие	Профилактин® БИОПрофилактин® ЛАЙТ	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4С
Калифорнийская щитовка	Батрайдер®	Опрыскивание в период вегетации
Цветоед	Биотлин®Танрек® от тлиБатрайдер® МатринБио®Кинмикс®	Опрыскивание во время фазы набухания почек, далее - по мере необходимости
Листовёртки	Герольд®Сэмпай® Шарпей®Кинмикс®	Опрыскивание во время начала появления гусениц
Плодожорка	Герольд®Сэмпай® Шарпей®Кинмикс®	Опрыскивание через 10-15 дней после цветения с последующей обработкой через 2 недели
Клещи	МатринБио® Фитоверм®Клещевит®	Опрыскивание при появлении вредителей

Мучнистая роса	Раёк®	Опрыскивание: 1-е в фазе "розовый бутон", 2-е - после цветения, последующие - при необходимости с интервалом 10-14 дней
Парша	Бордоская жидкость	Ранневесеннее опрыскивание в фазе "зеленого конуса", последующие - в период вегетации
Монилиоз, бактериальный ожог	Фитомицин®	Опрыскивание в период вегетации в фазе обособления бутонов, цветения и далее - по мере необходимости