

Работаем
для Вас с 1990_г

avgust 
crop protection



2018
Каталог
продукции



Старые препараты от жука не помогают?



Проблема:
массовое распространение колорадского жука



Жукоед® Новое решение в борьбе с колорадским жуком!

- уникальная комбинация трёх активных веществ, по-разному действующих на жука и его личинок
- одной обработки достаточно для уничтожения всей популяции вредителя
- воздействует даже на особи, резистентные к одному из компонентов
- обладает антистрессовыми свойствами для растений, увеличивает урожайность

ТРОЙНОЙ УДАР ПО ЖУКУ!

Оглавление

О компании.....	2
Рекомендации садоводам и огородникам.....	4
Препараты от вредителей (инсектициды, репелленты).....	8
Препараты от болезней (фунгициды).....	32
Адъювант.....	45
Препараты от сорняков (гербициды).....	47
Регуляторы роста растений.....	58
Комплексные удобрения.....	68
Препараты от грызунов (родентициды).....	77
Серия «БАУ».....	82
Препараты бытовой химии.....	87
Серия «Биоземледелие».....	99
Серия «Двойная защита».....	106
Серия «Августина».....	110



С нами расти легче

АО Фирма «Август» – крупнейшая российская компания по разработке, производству и информационно-технологическому сопровождению применения химических средств защиты растений.

Согласно данным независимой аналитической компании «Kleffmann Group», по итогам 2017 года, «Август» стал лидером рынка пестицидов в России. В этом же году бренд **AVGUST** награждён национальной Премией доверия потребителей **«Марка №1 в России – 2017»**.

Для дачников России и стран ближнего зарубежья компания **«Август»** производит более 170 видов продукции. Каждый год продуктовая линейка расширяется за счёт выпуска новых препаратов от вредителей, болезней, сорняков, регуляторов роста, препаратов бытовой химии. Продукция представлена во всех регионах Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстане. Она доступна в таких сетевых магазинах как ОБИ, Леруа Мерлен, Касторама, Ашан, Перекрёсток и др.

В 2017 году было приобретено около 40 млн. единиц продукции, а это значит, что каждый четвертый россиянин купил флакон, пакет или ампулу с логотипом компании.

У **«Августа»** 56 представительств в регионах России и 17 дочерних компаний за рубежом, имеется собственный научный центр. Его специалисты занимаются поиском наиболее эффективных действующих веществ и формированием их комбинаций. Учёные **«Августа»** разработали более 100 новых рецептур и получили 32 патента на изобретения.

В производственную базу компании входят филиал **АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов»** в Чувашской Республике и завод **«Август-Бел»** в Республике Беларусь. И чтобы обеспечить растущие потребности сельхозпредприятий, фирма строит новый завод в Татарстане, в ОЭЗ «Алабуга». Предприятие **«Август-Алабуга»** станет самой большой по объёмам выпускаемой продукции производственной площадкой **«Августа»**. Его мощность превысит проектные мощности двух существующих заводов, вместе взятых.

«АВГУСТ» – №1 В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ!

В декабре 2017 года бренд **AVGUST** стал лауреатом ежегодной премии доверия потребителей **«Марка №1 в России»** в категории «Средства защиты растений»!

И эта награда не случайна. Компания **«Август»** ежегодно выпускает новые эффективные препараты, совершенствует препаративные формы, чутко прислушивается к пожеланиям покупателей.

Победители определялись путём открытого голосования, выражая свое отношение к производителям различных товаров и компаниям, предоставляющих услуги, путём заполнения открытых анкет в электронных СМИ и социальных сетях, выбирая лучших из лучших. Церемония награждения проходила в Государственном Кремлевском Дворце, где наша компания получила заслуженную награду.

Если нас выбрали потребители, значит, мы этого достойны!

Рекомендации садоводам и огородникам



Культура	Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки
Картофель 	Колорадский жук, проволочник	Табу	Обработка клубней перед посадкой или дна борозды во время посадки
	Колорадский жук, картофельная коровка	Жукоед, Танрек, Кинмикс, Фитоверм, Битоксибациллин, Шарпей, Биотлин БАУ	Опрыскивание по мере появления вредителей
	Проволочник	Провотокс, Террадокс	Внесение гранул при посадке
	Фитофтороз, альтернариоз	Ордан, Ревус	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней
	Ризоктониоз, фузариоз, гнили при хранении: фузариозная, фомозная, мокрая бактериальная гниль, альтернариозная гниль	Синклер	Обработка клубней перед посадкой и перед закладкой на хранение
	Подавление прорастания клубней при хранении	Трафик	Опрыскивание растений за 21-25 дней до сбора урожая
	Сорняки (амброзия, лебеда, марь, щирица и др.)	Лазурит	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Миура	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние)
Томаты, перцы, баклажаны 	Белокрылка, тли, клещи, трипсы, совка	Алиот, Фитоверм, Танрек от тли, Биотлин, Биотлин БАУ, Клещевит	Опрыскивание по мере появления вредителей
	Фитофтороз, альтернариоз	Ордан, Ревус	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней
	Корневые гнили	Фитолавин	Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – с интервалом 15 дней
	Бактериальная гниль, чёрная бактериальная пятнистость	Фитолавин	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней
	Сорняки (амброзия, лебеда, марь, щирица и др.)	Лазурит Т	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт или сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт
	Перерастание рассады томатов и перцев	Рэгги	Опрыскивание рассады в фазе 2-4 листьев, последующие – с интервалом 5-8 дней, полив рассады под корень, в фазе 3-4 листьев
Огурец, кабачок, тыква 	Белокрылка, тли, клещи, трипсы	Фитоверм, Биотлин, Битоксибациллин, Танрек от тли, Биотлин БАУ, Клещевит	Опрыскивание по мере появления вредителей
	Пероноспороз (ложная мучнистая роса), антракноз, пятнистости, мучнистая роса	Ордан	Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания, повторное – через 7-14 дней
	Корневые гнили	Фитолавин	Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – с интервалом 15 дней
		Бактофит	Замачивание семян перед посевом
Капуста 	Листогрызущие гусеницы (капустная белянка, совка, моль), тли, блошки	Алиот, Кинмикс, Сэмпай, Фитоверм, Герольд, Лепидоцид, Шарпей, Битоксибациллин	Опрыскивание по мере появления вредителей
	Капустная муха	Мухоед, Террадокс	Рассев гранул вокруг растений после посадки в период массовой яйцекладки
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Миура	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние)
	Перерастание рассады	Рэгги	Полив рассады под корень в фазе семядольных листьев, последующие с интервалом 7 дней

Культура	Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки
Морковь 	Муравьи	Муравьед	Полив муравьиных колоний
	Муха морковная, листоблошки	Шарпей	Опрыскивание в период вегетации
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Миура	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние)
Лук, чеснок 	Луковая муха	Мухоед, Террадокс	Внесение гранул в почву при посадке луковиц
	Пероноспороз	Ревус	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней
	Подавление прорастания луковиц при хранении	Трафик	Опрыскивание растений за 14-21 день до сбора урожая
	Злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Миура	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) и при высоте 10-15 см (многолетние)
Яблоня, груша 	Предохранение коры от повреждений	Садовая побелка	Обработка стволов осенью или весной до распускания почек
		Садовый вар (брикет, туба)	Применение после обрезки
	Зимующие стадии медяниц, тлей, листовёрток, щитовок, клещей	Профилактиктин	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4 °С
	Яблонный цветоед, медяницы, тли	Кинмикс, Танрек от тли, Биотлин, Алиот	Опрыскивание во время фазы набухания почек
	Листовёртки, моли, шелкопряд	Кинмикс, Сэмпай, Фитоверм, Лепидоцид, Битоксибациллин, Шарпей, Алиот, Герольд	Опрыскивание во время начала появления гусениц
	Плодожорка		Опрыскивание через 10-15 дней после цветения с последующей обработкой через 2 недели
	Американская белая бабочка	Герольд	Опрыскивание неплодоносящих садов в период вегетации
	Клещи	Фитоверм, Клещевит	Опрыскивание при появлении вредителей
	Парша, мучнистая роса, пятнистости	Раёк, Тиовит Джет	Опрыскивание: 1-е – в фазе “розовый бутон”, 2-е – после цветения, последующие – при необходимости с интервалом 10-14 дней
	Монилиоз, парша, пятнистости	Бордоская жидкость	Ранневесеннее опрыскивание в фазе “зелёного конуса”, последующие – в период вегетации
	Монилиоз, бактериальный ожог	Фитолавин	Опрыскивание в период вегетации в фазе обособления бутонов, цветения и далее – по мере необходимости
Вишня, слива, персик 	Предохранение коры от повреждений	Садовая побелка	Обработка стволов осенью или весной до распускания почек
		Садовый вар (брикет, туба)	Применение после обрезки
	Зимующие стадии медяниц, тлей, листовёрток, щитовок, клещей	Профилактиктин	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4°С
	Тли, долгоносики, плодожорка	Кинмикс	Опрыскивание при появлении вредителей
	Коккомикоз, монилиоз, пятнистости, плодовая гниль	Бордоская жидкость	Ранневесеннее опрыскивание в фазе “зелёного конуса”, последующие – в период вегетации

Культура	Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки
Смородина, крыжовник 	Зимующие стадии медяниц, тлей, листовёрток, щитовок, клещей	Профилактин	Опрыскивание ранней весной до распускания почек при t не ниже +4°С
	Огнёвка, листовёртки, галлицы, пилильщики, клещи, пяденица	Алиот , Кинмикс, Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид, Клещевит	Опрыскивание при появлении вредителей
	Тли	Танрек от тли , Биотлин, Биотлин БАУ	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая
	Мучнистая роса	Топаз, Тиовит Джет	Опрыскивание до и сразу после цветения
	Антракноз, пятнистости, ржавчина	Бордоская жидкость	Ранневесеннее опрыскивание в фазе "зелёного конуса", последующие – в период вегетации
Земляника, малина 	Листовёртки, пилильщики, огнёвки, пяденицы	Лепидоцид	Опрыскивание в период вегетации с интервалом в 7-8 дней
	Слизни, улитки	Слизнеед	Рассев гранул по поверхности почвы междурядий, дорожек
	Сорняки (осот, одуванчик, ромашка и др.)	Лонтрел-300 Д (земляника)	Опрыскивание после сбора урожая
	Образование усов	Рэги	Опрыскивание в начале фазы бутонизации и через 7 дней после первого опрыскивания
Виноград 	Листовёртки	Лепидоцид, Шарпей , Битоксибациллин, Алиот	Опрыскивание в фазе разрыхления соцветий и фазе завязывания ягод
	Листовая филлоксеры, клещи, мучнистый червец	Алиот , Тиовит Джет	Опрыскивание при появлении вредителей
	Оидиум	Тиовит Джет	Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания
Цветочно-декоративные культуры 	Тли, клещи, трипсы, пилильщики, белокрылка	Фитоверм, Алиот , Танрек от тли , Биотлин, Цветолукс БАУ , Клещевит	Опрыскивание при появлении вредителей
	Щитовки, ложнощитовки	Алиот	Опрыскивание при появлении вредителей
	Агатова совка, совка-гамма, пяденицы, боярышница, бражник	Герольд	Опрыскивание при появлении вредителей
	Почвообитающие вредители	Мухоед , Террадокс	Внесение гранул на поверхность почвы вокруг растений с последующим рыхлением
	Ржавчина, мучнистая роса, пятнистости	Чистоцвет , Чистоцвет БАУ , Ракурс , Тиовит Джет, Топаз, Бактофит	Опрыскивание при первых признаках заболевания
	Гнили (фузариоз, пенициллёз и др.)	Здоровая земля	Полив почвы в период вегетации
	«Чёрная ножка»	Здоровая земля	Дезинфекция почвы методом полива после высева семян
Хвойные растения 	Пилильщики, клещи, щитовки, хермесы, ложнощитовки, тли, мучнистые червцы, листовёртки	Алиот , Пиоцид	Опрыскивание при появлении вредителей
	Личинки майского жука	Валлар , Террадокс	Обмакивание корней сеянцев (саженцев) перед высадкой. Внесение гранул на глубину 5-10 см через 25-30 дней после высадки растений
	Снежное и обыкновенное шютте, ржавчина*	Ракурс	Опрыскивание при первых признаках заболевания

* по ржавчине – в стадии регистрации

Другое	Назначение (объект)	Препарат	Время и способ обработки
Комнатные растения 	Тли, клещи, трипсы, белокрылка	Фитоверм, Танрек от тли , Биотлин, Цветолукс БАУ , Клещевит	Опрыскивание по мере появления вредителей с интервалом 7-10 дней
	Мучнистая роса, ржавчина, пятнистости	Чистоцвет , Топаз, Бактофит	Опрыскивание при первых признаках заболевания
	«Чёрная ножка»	Здоровая земля	Полив почвы в горшках в период вегетации
Газон 	Фузариозная снежная плесень, офиоболезная корневая гниль	Здоровый газон	Полив почвы в местах поражения травостоя
	Сорняки (осот, ромашка, одуванчик, клевер, щавель, подорожник, горцы)	Деймос , Лонтрел-300Д , Хакер	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса
Многолетние вредители 	Медведка	Гризли , Террадокс	Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см в период вегетации
	Личинки майского жука	Валлар , Террадокс	Обмакивание корней сеянцев (саженцев) перед высадкой. Внесение гранул на глубину 5-10 см через 25-30 дней после высадки растений
	Слизни, улитки	Слизнеед	Рассев гранул по поверхности почвы междурядий, дорожек
	Садовые муравьи	Муравьед	Полив муравьиных колоний
	Садовые и домовые муравьи	Муравьед Супер	Раскладка на подложках гранул в местах скопления муравьев
Сорная растительность 	Однолетние и многолетние сорняки (пырей, выюнок, бодяк и др.), кустарники	Торнадо , Раундап, Торнадо БАУ	Предпосевная обработка участка, опрыскивание сорняков в приствольных кругах, вблизи дорожек и заборов
	Злостные сорняки, в том числе борщевик	Агрокиллер , Деймос	Предпосевная обработка участка, опрыскивание сорняков вдоль дорожек и заборов
Регуляторы роста и удобрения 	Повышение урожайности, устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, стимулирование роста	Аминозол, Гумат+7 Йод, МикроМикс , Корнепитатель-Цветы , Лебозол Калий ⁴⁵⁰ , Лебозол Нутриплант ⁸⁻⁸⁻⁶ , Расцвет , Фитозонт универсальный , Экогель, Янтарин	Предпосевная обработка, обработка до и после цветения
	Стимулирование корнеобразования	Рибав-Экстра, Корень Супер , Экогель, Фитозонт хвойный , Фитозонт универсальный	Обработка черенков и корневой системы саженцев и сеянцев
	Предотвращение перерастания, улучшение качества рассады. Повышение продолжительности цветения и декоративных качеств цветочных культур	Рэги	Опрыскивание или полив растений под корень
Грызуны и кроты 	Мышевидные грызуны (крысы, мыши, полёвки)	Зерноцин НЕО, Рэтмэн , Super-Cat	Раскладка приманок в местах скопления (обитания) вредителей
	Кроты	Кротомет	Раскладка гранул в кротовины

Препараты от вредителей ИНСЕКТИЦИДЫ



Алиот

Универсальный препарат
от комплекса вредителей

- обладает тройным действием – контактным, кишечным и частично фумигационным
- уничтожает сосущих, грызущих вредных насекомых и клещей
- применяется на овощных, плодовых, ягодных, цветочных, декоративных культурах и винограде

Срок годности	2 года
Объём упаковки	5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	570 г/л малатиона, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодожорка, листовёртки, медяница, тли	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	до 3 л/дерево (зависит от возраста и сорта дерева)	2	21
 ВИНОГРАД	Гроздевая листовёртка, клещи	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	до 1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	2	21
 ТОМАТЫ открытого грунта	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/5 л воды	до 5 л/100 м²	2	21
 КАПУСТА	Белянки, капустная совка, капустная моль, тли, мухи	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/5 л воды	до 5 л/100 м²	1	21
 СМОРОДИНА	Смородинный почковый клещ	Опрыскивание в период бутонизации	10 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	2	21
	Листовёртки, щитовки, тли, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	2	21
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Боярышница, тли, листоеды, пилильщики, паутинные клещи, щитовки, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	2	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Табачный трипс, тли, клопы, совки, паутинные клещи, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	до 5 л/100 м²	2	–



Биотлин®

avgust crop protection

Системный препарат для уничтожения различных видов тли на плодовых, ягодных, овощных и цветочных культурах

- эффективен против насекомых, скрытоживущих и питающихся на нижней стороне листа
- обладает высокой скоростью воздействия – эффект от обработки наблюдается уже через несколько часов
- не вызывает привыкания у вредителей

Срок годности	4 года
Объём упаковки	3 мл (ампула); 9 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество	200 г/л имидаклоприда, ВРК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОГУРЦЫ И ТОМАТЫ защищённого грунта	Тли, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	до 30 л/100 м²	1	3
	Тли	Опрыскивание в период появления вредителей	3 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/деревцо (зависит от возраста и сорта дерева)	1	7
 ЯБЛОНЯ	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/деревцо (зависит от возраста и сорта дерева)	1	60
	Тли	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 0,5 до 1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	60
 СМОРОДИНА	Тли	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 0,5 до 1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	60
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ защищённого грунта	Тли, цикадки, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	10 л/100 м²	1	–



Валлар®

avgust crop protection

Первый препарат для защиты от личинок майского жука (хруща) в личных подсобных хозяйствах

- предотвращает гибель молодых деревьев
- увеличивает приживаемость саженцев
- эффект проявляется уже через несколько часов после контакта с вредителем

Срок годности	3 года
Объём упаковки	50 г (пакет)
Действующее вещество	40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 САЖЕНЦЫ И СЕЯНЦЫ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ, ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР	Личинки майского и других видов хрущей, проволочники и ложнопроволочники	Обмакивание корней сеянцев (саженцев) в инсектицидно-земляную «болтушку» перед высадкой	8 г/1 л «болтушки»	«Болтушку» готовят непосредственно перед высадкой посадочного материала: в ёмкость налить примерно 200 мл воды, высыпать 8 г (3 полных чайных ложки) препарата и при постоянном помешивании добавлять землю и воду до получения 1 л однородной кашицеобразной массы	1	–
	Личинки майского и других видов хрущей, проволочники и ложнопроволочники	Повторное внесение гранул препарата через 25-30 дней после высадки растений в грунт. Гранулы раскладываются поверхностно с последующей заделкой на глубину 5-10 см	–	50 г/10 м²	1	–



Герольд®

Уникальный препарат от яблонной плодовой, боярышницы и других вредителей

- нарушает развитие яиц и личинок насекомых
- защищает не менее 14 дней
- активен в отношении гусениц листовёрток, пядениц, бражника, различных совок, молей и др.
- применяется на плодовых, овощных, декоративных и цветочных культурах

Срок годности	3 года
Объём упаковки	5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	240 г/л дифлубензулона, ВСК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодовая, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта)	2	40
 НЕПЛОДОНОСЯЩИЕ САДЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта)	1	–
 КАПУСТА	Капустная совка, белянки, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/4 л воды	до 4 л/100 м²	1	30
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Пяденицы, боярышница, бражник	Опрыскивание в период вегетации	10 мл/10 л воды	0,5-1 л/куст	1	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Агатовая совка, совка-гамма, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	до 5 л/100 м²	1	–



Гризли®

Оригинальный препарат-приманка для защиты картофеля, овощных, цветочных и других культур от медведки

- уничтожает как взрослых насекомых, так и их личинки в течение первых суток после обработки
- удобная в применении гранулированная форма
- специальные вкусовые добавки обеспечивают отличную поедаемость приманки
- гарантирует длительную защиту – не менее 3-х недель

Срок годности	2 года
Объём упаковки	100 г (пакет)
Действующее вещество	40 г/кг диазинона, Г

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ (кроме раннеспелых сортов)	Медведка	Внесение гранул в почву при посадке клубней и в период вегетации	20 г/10 м²	2	60
 КАПУСТА (кроме раннеспелых сортов), ЛУК (кроме лука на перо)	Медведка	Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см в период вегетации	20 г/10 м²	2	60
 ЗЕМЛЯНИКА (после сбора урожая)	Медведка	Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см после сбора урожая	20 г/10 м²	2	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Медведка	Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см в период вегетации	20 г/10 м²	2	–



Жукоед®

Новый трехкомпонентный препарат от колорадского жука

- содержит три активных вещества с разными механизмами действия
- воздействует даже на особи, резистентные к одному из компонентов
- высокая активность при различных температурах
- полная гибель насекомых наступает за 24 часа

Срок годности	3 года
Объём упаковки	9 мл (флакон)
Действующее вещество	125 г/л альфа-циперметрина + 100 г/л имидаклоприда + 50 г/л клотианидина, СК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1	20



Кинмикс®

Препарат от комплекса вредителей на плодовых, ягодных и овощных культурах

- обладает широким спектром действия, уничтожает различные виды вредных насекомых
- защищает растения на срок до двух недель
- имеет низкие нормы расхода

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	50 г/л бета-циперметрина, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА	Тли	Опрыскивание до и после цветения	2 мл/5 л воды	от 3 л/дерево (зависит от возраста и сорта)	2	30
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодожорка, листовёртки, тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	2 мл/5 л воды	до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта)	2	20
	Яблонная медяница, яблонный цветоед	Опрыскивание в период бутонизации	2 мл/5 л воды	до 3 л/дерево (зависит от возраста и сорта)	2	20
 СМОРОДИНА	Листовёртки, тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	2 мл/5 л воды	0,5-1 л/куст	2	20
 КРЫЖОВНИК	Пилильщики, тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	2 мл/5 л воды	0,5-1 л/куст	2	20
 КАПУСТА	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	2-3 мл/4 л воды	до 4 л/100 м²	1	20
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	1,5-2 мл/4 л воды	до 4 л/100 м²	1	20



Клещевит®

avgust crop protection

Биологический препарат для борьбы с клещами на различных культурах

- обладает высокой скоростью воздействия – клещи прекращают питание через 6-8 часов, а их полная гибель наступает через 3-4 дня
- имеет минимальный срок ожидания – плоды можно употреблять в пищу уже через 3 дня после обработки
- не вызывает привыкания у насекомых-вредителей

Срок годности	2 года
Объём упаковки	4 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	2 г/л аверсектина С, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОГУРЦЫ, ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ <i>защищённого грунта</i>	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней	10 мл/1 л воды	1 л/10 м²	2	3
 ТОМАТЫ <i>защищённого грунта</i>	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней	10 мл/1 л воды	1 л/10 м²	2	3
 СМОРОДИНА	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	1 л/куст	2	3
 ЯБЛОНЯ	Паутинный и красный плодовые клещи, клещ Шлехтендаля	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/1 л воды	до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта дерева)	2	3
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ <i>защищённого грунта</i>	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	1 л/10 м²	3	1
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ <i>открытого грунта</i>	Паутинный клещ	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней	2 мл/1 л воды	1 л/10 м²	4	1
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Паутинный клещ	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней	2 мл/1 л воды	0,1 л/1 м²	4	1



Муравьед®

avgust crop protection

Современное средство для борьбы с садовыми муравьями

- обладает высокой контактно-кишечной активностью
- не оказывает отрицательного влияния на почвенные микроорганизмы
- применяется в малых нормах расхода: 1 мл достаточно для обработки 5-10 муравейников

Срок годности	3 года
Объём упаковки	1 мл, 7 x 1 мл (ампула); 10 мл, 50 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество	600 г/л диазинона, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 МОРКОВЬ	Муравьи	Внесение методом полива в места скопления муравьёв	1 мл/10 л воды	10 л/5 м²	1	40
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ЗЕМЛЯНИКА (после сбора урожая), ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Муравьи	Внесение методом полива в места скопления муравьёв	1 мл/10 л воды	10 л/5 м²	1	–



Мухоед®

avgust crop protection

Незаменимое средство для борьбы с почвенными вредителями на цветочных растениях

- удобен в применении – препарат полностью готов для внесения в почву
- уничтожает личинок и взрослых насекомых
- гранулы препарата равномерно распределяются в почве и постепенно выделяют действующее вещество
- не оказывает отрицательного влияния на растения

Срок годности	3 года
Объём упаковки	10 г (пакет)
Действующее вещество	40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Почвенные мушки, грибные комарики, бороздчатый долгоносик	Внесение на поверхность почвы вокруг растений с последующим рыхлением	2-3 г/1 м²	1

Примечание: 1 чайная ложка препарата соответствует 5 г



НОВИНКА 2018

Пиноцид®

avgust crop protection

Незаменимый препарат от комплекса вредителей на хвойных растениях

- уничтожает вредителей за 24 часа
- действует на широкий спектр насекомых
- имеет пролонгированное действие
- обладает выраженными системными и контактными свойствами
- высокая активность в широком диапазоне температур

Срок годности	3 года
Объём упаковки	2 мл (ампула); 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество	125 г/л альфа-циперметрина + 100 г/л имидаклоприда + 50 г/л клотианидина, СК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ХВОЙНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	Хермесы, тли, щитовки, ложнощитовки, мучнистые червецы, пилильщики, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	0,5-1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста) 1-5 л/дерево (зависит от возраста и объёма кроны)	1 1	–



Мухоед®

Высокоэффективное средство для борьбы с почвенными вредителями на овощных культурах

- удобен в применении – препарат полностью готов для внесения в почву
- уничтожает личинки и взрослых насекомых
- быстро разлагается и не накапливается в почве
- не оказывает отрицательного влияния на растения

Срок годности 3 года
Объём упаковки 25 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЛУК (кроме лука на перо)	Луковая муха	Внесение на поверхность почвы при посадке с последующим рыхлением	50 г/10 м²	1	60
 КАПУСТА	Капустная муха	Внесение на поверхность почвы в районе корневой шейки с одновременным рыхлением при высадке рассады	40 г/10 м²	1	60

Примечание: 1 чайная ложка препарата соответствует 5 г



Провотокс®

Эффективный препарат для защиты от проволочника

- обладает контактно-кишечным механизмом действия
- характеризуется длительным защитным периодом
- снижает число поврежденных клубней
- не вызывает привыкания у вредителей
- не токсичен для растений в рекомендуемых нормах расхода

Срок годности 3 года
Объём упаковки 40 г, 120 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ (кроме раннеспелых сортов)	Проволочники	Внесение в почву при посадке	40 г/10 м²	1	–



Профилактин®

Уникальный препарат для ранневесенней обработки плодовых и ягодных культур

- борется с зимующими стадиями вредителей
- действует уже при температуре от +4°C
- уничтожает клещей, щитовок, ложнощитовок, медяниц, тлей, листовёрток и других насекомых

Срок годности	2 года
Объём упаковки	500 мл (флакон)
Действующее вещество	13 г/л малатиона + 658 г/л вазелинового масла, МКЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША, СЛИВА, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ	Зимующие фазы медяниц, листовёрток, тлей, клещей, щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C	0,5 л/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и сорта)	1	60
 СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК	Зимующие фазы листовёрток, тлей, клещей, щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C	0,5 л/10 л воды	от 1 до 1,5 л/куст	1	60



Слизнед®

Современный препарат от слизней и улиток на овощных, плодовых, ягодных, цитрусовых, цветочно-декоративных культурах и винограде

- удобен в применении
- обладает высокой эффективностью и длительным защитным действием
- помогает избежать снижения урожайности и потери товарного вида продукции

Срок годности	3 года
Объём упаковки	15 г, 30 г, 90 г (пакет)
Действующее вещество	60 г/кг метальдегида, Г

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОВОЩНЫЕ, ПЛОДОВЫЕ, ЦИТРУСОВЫЕ, ЦВЕТОЧНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ЗЕМЛЯНИКА, ВИНОГРАД	Слизни, улитки	Рассев гранул по поверхности почвы междурядий, дорожек	30 г/10 м²	1	–



Сэмпай®

Средство для уничтожения гусениц на овощных и плодовых культурах

- вызывает быструю гибель вредителей в течение 0,5-2 ч.
- обладает хорошим отпугивающим эффектом
- уничтожает вредителей на любой стадии развития
- имеется опыт успешного применения против американской бабочки и листовёртки на винограде

Срок годности	4 года
Объём упаковки	5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	50 г/л эсфенвалерата, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и сорта)	1	30
 КАПУСТА	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	2,5 мл/5 л воды	до 5 л/100 м²	1	30



Табу®

Современный протравитель клубней картофеля от колорадского жука и проволочника

- обладает выраженной системной активностью, защищая растения на уязвимой стадии проростков и всходов
- имеет длительный период защитного действия – до 45 дней
- эффективен вне зависимости от условий окружающей среды

Срок годности	3 года
Объём упаковки	10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество	500 г/л имидаклоприда, ВСК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней перед посадкой	8 мл/1 л воды	1 л/100 кг клубней	1	60
		Обработка дна борозды во время посадки	4 мл/10 л воды	10 л/100 м²	1	60



Танрек®

Проверенный временем препарат для борьбы с личинками и взрослыми особями колорадского жука

- обладает системным механизмом действия
- устойчив к смыванию дождём, обеспечивает защиту всех частей растений
- характеризуется длительным периодом защитного действия, поэтому достаточно одной обработки за сезон
- эффективен при любых температурах

Срок годности	4 года
Объём упаковки	1 мл, 7 x 1 мл (ампула); 10 мл, 50 мл, 100 мл (флакон)
Действующее вещество	200 г/л имидаклоприда, ВРК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	РАСХОД	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	1 мл/5 л воды	5 л/100 м²	1	20



Террадокс®

Универсальный препарат от медведки, майского хруща, капустной и луковой мух, проволочников и других вредителей

- применяется для защиты овощных, плодовых, ягодных, цветочных, лесных культур и картофеля
- имеет усовершенствованную гранулированную форму
- создает надёжную длительную защиту вокруг растений
- обладает высокой скоростью воздействия
- не токсичен для культур в рекомендуемых нормах

Срок годности	3 года
Объём упаковки	100 г, 200 г (пакет)
Действующее вещество	40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ (кроме раннеспелых сортов)	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см в период вегетации	20 г/10 м²	2	60
	Проволочники	Внесение в почву при посадке картофеля	40 г/10 м²	1	60
 КАПУСТА (кроме раннеспелых сортов)	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см в период вегетации	20 г/10 м²	2	60
	Капустные мухи	Внесение на поверхность почвы при высадке рассады	40 г/10 м²	1	60
 ЛУК (кроме лука на перо)	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см в период вегетации	20 г/10 м²	2	60
	Луковая муха	Внесение на поверхность почвы при высадке луковиц	50 г/10 м²	1	60
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (кроме горшечных)	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см в период вегетации	20 г/10 м²	2	–
	Почвенные мушки, бороздчатый долгоносик, грибные комарики	Внесение на поверхность почвы вокруг растений	2-3 г/1 м²	1	–
 ЗЕМЛЯНИКА (после сбора урожая)	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см после сбора урожая	20 г/10 м²	2	–
 САЖЕНЦЫ И СЕЯНЦЫ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ, ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР	Личинки майского жука и хрущей, проволочники, ложнопроволочники	Обмакивание перед высадкой в грунт корней сеянцев (саженцев) в «болтушку», которая готовится в пропорции: 0,2 л воды+8 г препарата+0,8 л земли	8 г/1 л «болтушки»	1	–
		Повторное внесение препарата через 25-30 дней после высадки в грунт поверхностно с последующей заделкой на глубину 5-10 см	40-50 г/10 м²	1	–



Танрек®

Эффективное средство от тли и белокрылки на плодовых, ягодных, овощных и цветочных культурах

- обладает высокой системной активностью, позволяет предотвратить развитие новых поколений вредителей
- устойчив к смыванию дождём
- характеризуется длительным защитным периодом
- эффективен независимо от погодных условий

Срок годности	4 года
Объём упаковки	1,5 мл, 7 x 1,5 мл (ампула); 12 мл (флакон)
Действующее вещество	200 г/л имидаклоприда, ВРК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
ЯБЛОНЯ	Тли	Опрыскивание в период вегетации	3 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и сорта)	1	7
	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дереву (зависит от возраста и сорта)	1	7
СМОРОДИНА	Тли	Опрыскивание до цветения	3 мл/10 л воды	от 0,5 до 1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	7
ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ защищённого грунта	Тли, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	10 л/100 м²	1	3
ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Тли, цикадки, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/10 л воды	10 л/100 м²	1	–



Шарпей®

Универсальный быстродействующий препарат от комплекса вредителей

- оказывает мгновенное действие на вредителей – «нокдаун-эффект»
- экономичен благодаря низким нормам расхода
- способен нарушать откладку яиц у взрослых насекомых и питание личинок
- имеет прогрессивную препаративную форму (микроэмульсия), устойчивую к воздействию высоких температур

Срок годности	3 года
Объём упаковки	1,5 мл, 7 x 1,5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	250 г/л циперметрина, МЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук, картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/5 л воды	до 5 л/100 м²	2	20
КАПУСТА	Белянки, совки, моли	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/5 л воды	до 5 л/100 м²	3	25
ЯБЛОНЯ	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/10 л воды	до 5 л/дереву (зависит от возраста и сорта)	2	20
ВИНОГРАД	Листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	3 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	3	25
МОРКОВЬ*	Муха морковная, листоблошки	Опрыскивание в период вегетации	5 мл/4 л воды	до 4 л/100 м²	2	20

*зарегистрировано в республике Беларусь



Фитоверм®

avgust crop protection

Биопрепарат для борьбы с комплексом вредителей на различных культурах

- высокая скорость воздействия – насекомые прекращают питание уже через 6-8 часов, полная гибель вредителей наступает через 3-4 дня
- применяется также для защиты от клещей
- имеет минимальные сроки до сбора урожая

Срок годности	2 года
Объём упаковки	4 мл (ампула); 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество	2 г/л аверсектина С, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 СМОРОДИНА	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	1 л/куст	2	3
	Пяденицы, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/1 л воды	1 л/куст	2	3
 ЯБЛОНЯ	Паутинный и красный плодовый клещи, клещ Шлехтендала, листовёртки, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации	1,5 мл/1 л воды	от 2 до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта)	2	3
	Яблонная плодожорка, совки	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	от 2 до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта)	1	3
 КАПУСТА	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/1 л воды	1 л/25 м²	2	3
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/4 л воды	до 4 л/100 м²	3	1

avgust crop protection

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ, ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ защищённого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней	10 мл/1 л воды	1 л/10 м²	2	3
	Персиковая, бахчевая тли	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней	8 мл/1 л воды	1 л/10 м²	3	3
	Табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней	10 мл/1 л воды	1 л/10 м²	3	3
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ защищённого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней	2 мл/1 л воды	1 л/10 м²	3	1
	Зелёная розанная тля	Опрыскивание вегетирующих растений с интервалом 14-16 дней	4 мл/1 л воды	1 л/10 м²	3	1
	Западный цветочный трипс	Опрыскивание растений в период вегетации	8 мл/1 л воды	1 л/10 м²	3	1
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней	2 мл/1 л воды	1 л/10 м²	4	1
	Тли	Опрыскивание растений по мере появлений вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней	8 мл/1 л воды	1 л/10 м²	4	1
	Трипсы	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней	10 мл/1 л воды	1 л/10 м²	4	1
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Паутинный клещ	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней	2 мл/1 л воды	0,1 л/1 м²	4	1
	Тли	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней	2 мл/0,25 л воды	0,1 л/1 м²	4	1
	Трипсы	Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней	2 мл/0,2 л воды	0,1 л/1 м²	4	1



Кротомет®

Экологически безопасный препарат для отпугивания кротов

- не токсичен для человека и теплокровных животных
- не опасен для пчёл
- не загрязняет окружающую среду

Срок годности 1 год
Объём упаковки 75 г (пакет)
Действующее вещество 150 г/кг Allium sativum, Г

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОВОЩНЫЕ, ЦВЕТОЧНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ, ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ГАЗОНЫ, ЛУГА	Кроты	Между имеющимися на участке соседними кротовинами (выбросами земли) сделать вертикальные вырезы до глубины хода. В вырез заложить по 5-7 г (1-2 столовых ложки) слегка смоченных водой гранул препарата в каждую сторону хода. Сверху вырез закрыть дощечкой (или картонкой) и засыпать землёй, отметить место внесения препарата. Через 2-3 дня проверить наличие препарата в норе. Если препарат засыпан землёй или выброшен кротом из норы, следует расчистить её и внести новую порцию препарата.	5-7 г/кротовину	Обработку проводить по мере необходимости	—





Бордоская жидкость

Препарат для обработки плодовых и ягодных культур от болезней ранней весной и в период вегетации

- легко применять, достаточно разбавить водой
- защищает от парши, монилиоза, коккомикоза, плодовой гнили и различных пятнистостей
- не вызывает ожогов на растениях

Срок годности 2 года
Объём упаковки 100 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество 172 г/л меди сульфата трёхосновного, ВСК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША	Парша, монилиоз	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёный конус»	250 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта)	1	60
		Опрыскивание в период вегетации: первое – после цветения; последующие – с интервалом 7 дней	100 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта)	3	38
 СЛИВА, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКОС	Клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёный конус»	250 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта)	1	60
		Опрыскивание в период вегетации: первое – после цветения; последующие – с интервалом 7 дней	100 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта)	3	28
 СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК	Септориоз, антракноз, столбчатая ржавчина	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зелёный конус»	250 мл/10 л воды	от 1 до 1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	1	60
		Опрыскивание в период вегетации: первое – после цветения; последующие – с интервалом 7 дней	100 мл/10 л воды	от 1 до 1,5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	3	смородина – 28 дней, крыжовник – 20 дней



Здоровый газон®

Надёжная защита газонных трав от болезней, передающихся через посадочный материал и почву

- эффективно подавляет гнили и плесень
- перемещается к точкам роста, защищая все органы растений, в т. ч. корневую систему
- имеет длительный период защитного действия – не менее 4-х недель

Срок годности 3 года
Объём упаковки 50 мл (флакон)
Действующее вещество 198 г/л тирама + 198 г/л карбоксина, ВСК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ГАЗОНЫ	Фузариозная снежная плесень, офиоболезная корневая гниль	Полив почвы в местах поражения травостоя с интервалом 14 дней	20 мл/10 л воды	10 л/2 м²	2	–



Здоровая земля®

Комплексный препарат для дезинфекции почвы

- идеальная профилактика развития корневых гнилей
- защищает от заболеваний на длительный срок
- подавляет почвенные инфекции в зоне корней

Срок годности 4 года
Объём упаковки 50 мл (флакон)
Действующее вещество 198 г/л тирама + 198 г/л карбоксина, ВСК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 РАССАДА ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ	«Чёрная ножка»	Дезинфекция почвы после высева семян методом полива	2 мл/1 л воды	1 л/0,2 м²	1	–
 ГОРШЕЧНЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ (кроме комнатных)	Ризиктониозная, питиозная и фузариозная корневые гнили, вертициллёзное увядание	Полив почвы в горшках в период вегетации растений	2 мл/1 л воды	1 л/1-20 горшков (зависит от размеров горшков)	1	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Ризиктониозная, питиозная и фузариозная корневые гнили, вертициллёзное увядание	Полив почвы в период вегетации растений	2 мл/1 л воды	1 л/1 м²	1	–



Ордан®

Незаменимое лекарство от болезней томатов, огурцов и картофеля

- характеризуется уникальным сочетанием двух активных веществ с различным механизмом действия
- обладает профилактическими, защитными и искореняющими свойствами
- не вызывает привыкания у возбудителей болезней
- выпускается также в инновационной водорастворимой упаковке

Срок годности водорастворимый пакет – 2 года, пакет – 3 года
Объём упаковки 12,5 г (водорастворимый пакет), 25 г (пакет)
Действующее вещество 689 г/кг меди хлорокиси + 42 г/кг цимоксанила, СП

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое до смыкания ботвы в рядках или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-14 дней	25 г/5 л воды	5 л/100 м²	3	20
 ТОМАТЫ открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней	25 г/5 л воды	5 л/100 м²	3	5
 ТОМАТЫ защищённого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней	25 г/8 л воды	8 л/100 м²	3	3
 ОГУРЦЫ открытого грунта	Пероноспороз (ложная мучнистая роса)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней	25 г/5 л воды	5 л/100 м²	3	5
 ОГУРЦЫ защищённого грунта	Пероноспороз (ложная мучнистая роса)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней	25 г/8 л воды	8 л/100 м²	3	3



Побелка садовая

Известное средство для обработки стволов деревьев

- образует покрытие, предохраняющее стволы от насекомых-вредителей и спор грибов-патогенов
- защищает от солнечных ожогов
- повышает стойкость плодовых деревьев к заморозкам и резким температурным перепадам
- не препятствует естественному воздухообмену

Срок годности	3 года
Объём упаковки	500 г (пакет)
Действующее вещество	природный мел, пленкообразующий компонент (натрий карбоксиметилцеллюлоза), порошок

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Солнечные ожоги, морозобойные трещины	Содержимое упаковки залить 750 мл горячей воды, перемешивать 1-2 минуты, оставить на 4-5 часов, после этого ещё раз перемешать. Приготовленный раствор нанести кистью на обрабатываемую поверхность. Перед обработкой стволы взрослых деревьев рекомендуется очистить металлической щеткой от старой, отслоившейся коры	500 г/750 мл воды (при необходимости полученный раствор можно разбавить водой до нужной консистенции)	1-2 дерева (зависит от возраста и сорта)	1-2 (весной или осенью)



Раёк®

Высокоэффективный препарат для обработки плодовых культур от болезней

- обладает длительным профилактическим и лечащим действием
- быстро проникает в ткани растений и не смывается дождём уже через 2 часа после опрыскивания
- защищает листья и плоды
- не вызывает образования «сетки» на плодах, обеспечивает высокое качество продукции

Срок годности	3 года
Объём упаковки	2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество	250 г/л дифеноконазола, КЭ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЯБЛОНЯ, ГРУША	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зелёный конус», «розовый бутон», последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней	1,5-2 мл/10 л воды	от 2 до 5 л/дерево (зависит от возраста и сорта)	4	20



Ракурс®

avgust crop protection

Эффективный препарат от комплекса болезней хвойных и декоративных культур

- содержит уникальную комбинацию двух действующих веществ, характеризующихся различной скоростью проникновения и распределения в растении
- обладает быстрым и сильным профилактическим и лечащим действиями
- имеет пролонгированный защитный период (более 20 дней)

Срок годности	3 года
Объём упаковки	4 мл (ампула); 48 мл, 480 мл (флакон)
Действующее вещество	240 г/л эпоксиконазола + 160 г/л ципроконазола, СК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ	Снежное и обыкновенное шютте, ржавчина*	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дерево (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	4	–
 ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/дерево (зависит от возраста дерева и объёма кроны)	2-3	–
 МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/5 л воды	2-5 л/100 м² (зависит от размера растений)	3	–

* находится в стадии регистрации



Ревус®

avgust crop protection

Надёжная защита лука, томатов и картофеля от различных болезней

- обладает повышенной дождеустойчивостью
- характеризуется длительной защитой
- способствует получению стабильных урожаев

Срок годности	3 года
Объём упаковки	1,2 мл (ампула)
Действующее вещество	250 г/л мандипропамида, КС

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней	6 мл/5 л воды	5 л/100 м²	4	5
 ТОМАТЫ открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней	5-6 мл/5 л воды	5 л/100 м²	4	5
 ЛУК (репка)	Пероноспороз (ложная мучнистая роса)	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней	6 мл/5 л воды	5 л/100 м²	2	15



Садовый вар

Необходимое средство
для заживления ран плодовых
и декоративных деревьев

- имеет две формы упаковки для удобства использования
- применяется при прививках и обрезке ветвей, а также для заживления ран, в т. ч. от солнечных ожогов

Срок годности	3 года (туба), 5 лет (брикет)
Объём упаковки	150 г (туба); 150 г (брикет)
Действующее вещество	<i>туба:</i> мягчитель, смола сосновая живичная, минеральное масло, пигментные частицы; <i>брикет:</i> мягчитель (петролатум), канифоль, парафин.

КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
 ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Отмершие и отставшие от древесины части коры срезать ножом до здоровой древесины, зачистить, продезинфицировать поражённое место раствором медного купороса и при помощи деревянной лопаточки тонким слоем замазать его садовым варом. При заделке глубоких ран разрешается добавлять в размягчённый вар наполнитель (мел или доломит в соотношении 1:1)



Синклер®

Протравитель клубней картофеля
от почвенных инфекций

- применяется для обработки картофеля перед посадкой и закладкой на хранение
- создает защитный экран на поверхности клубня и вокруг него в почве
- не оказывает отрицательного воздействия на полезные микроорганизмы

Срок годности	2 года
Объём упаковки	2 мл, 4 мл (ампула); 48 мл (флакон)
Действующее вещество	75 г/л флудиоксонила, СК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ	Ризиктониоз, фузариоз	Обработка клубней перед посадкой	20 мл/ 1 л воды	1 л/100 кг	1	–
	Гнили при хранении: фузариозная, фомозная, мокрая бактериальная гниль, альтернариозная гниль	Обработка клубней семенного картофеля перед закладкой на хранение с последующим подсушиванием	20 мл/ 1 л воды	1 л/100 кг	1	–

! Возможно добавление препарата **Табу** в раствор **Синклера** для предпосадочной обработки картофеля от вредителей и болезней



Тиовит® Джет

Средство для защиты различных культур от болезней и клещей

- сочетает в себе свойства фунгицида, акарицида и микроудобрения
- идеальная препаративная форма: хорошая прилипаемость, отличное контактное действие
- высокая биологическая эффективность и защита в течение 7-10 дней
- не фитотоксичен при соблюдении регламентов применения

Срок годности 3 года
Объём упаковки 30 г (пакет)
Действующее вещество 800 г/кг серы, ВДГ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ,ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ВИНОГРАД	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации	30-50 г/10 л воды	10 л/100 м²	4-6	1
	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации	30-40 г/10 л воды	10 л/100 м²	1	1
 ЯБЛОНЯ, ГРУША	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30-80 г/10 л воды	10 л/100 м²	1-6	1
 СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20-30 г/5-10 л воды	5-10 л/100 м²	1-3	1
 КРЫЖОВНИК	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20-30 г/5-10 л воды	5-10 л/100 м²	1-6	1
 РОЗЫ открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20-30 г/5-10 л воды	5-10 л/100 м²	2-4	1



Топаз®

Специализированный высокоэффективный препарат от мучнистой росы и ржавчины

- обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действиями
- останавливает рост мицелия возбудителя мучнистой росы через 2-3 часа после обработки
- быстро поглощается растениями, что снижает риск смывания дождём

Срок годности 4 года
Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 100 г/л пенконазола, КЭ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ,ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 СМОРОДИНА	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания	2 мл/10 л воды	10 л/100 м²	4	14
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/10 л воды	10 л/100 м²	1	–



Чистоцвет®

Эффективное средство для защиты цветочных и декоративных культур от комплекса болезней

- характеризуется длительным профилактическим и выраженным лечебным свойствами
- обладает системным действием и обеспечивает защиту растений до двух недель
- проникает в растения через 2 часа после обработки и не смывается дождём

Срок годности 3 года
Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 250 г/л дифеноконазола, КЭ

КУЛЬТУРА		БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ		Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	2 мл/5 л воды	5 л/100 м²	2	–
		Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	4 мл/5 л воды	5 л/100 м²	2	–
		Пятнистости	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	4 мл/5 л воды	5 л/100 м²	4	–
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ		Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	2 мл/10 л воды	10 л/100 м²	2	–
		Пятнистости	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	4 мл/10 л воды	10 л/100 м²	4	–

Адъювант
УСИЛИТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ



Адью®

avgust crop protection

Усилитель активности средств защиты растений и удобрений

- увеличивает проникающую способность препаратов
- предотвращает скатывание капель растворов с растений, листья которых густо опушены или сильно покрыты восковым налётом
- повышает дождеустойкость препаратов
- уменьшает степень испарения с листьев при обработке

Срок годности 4 года
Объём упаковки 2 мл (ампула)
Действующее вещество 900 г/л этоксилата изодецилового спирта

НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 СПОСОБСТВУЕТ ЛУЧШЕМУ ПРИЛИПАНИЮ И ПРОНИКНОВЕНИЮ В РАСТЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ	Препарат добавляется в рабочие растворы инсектицидов, гербицидов, фунгицидов, а также удобрений при каждом их использовании	2 мл/3 л рабочего раствора	согласно регламенту применения совместно используемого препарата	согласно регламенту применения совместно используемого препарата

Препараты от сорняков ГЕРБИЦИДЫ



Агрокиллер

Универсальный препарат от сорняков с повышенным содержанием действующего вещества

- уничтожает самые трудноистребимые сорняки, в том числе борщевик Сосновского
- вызывает полную гибель растений и их корневой системы
- высокая эффективность против кустарников

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	40 мл, 90 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество	500 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль), ВР

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 УЧАСТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ ГАЗОННЫХ ТРАВ	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам за 14 дней до посева газонных трав	30 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1
	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т. ч. борщевик	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам за 14 дней до посева газонных трав	40 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ (ПОСАДКУ) КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (обочины дорог, вдоль изгороди и т.д.)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т. ч. борщевик	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам	40 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1
	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам	30-50 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1

! Добавление препарата **Адью** в раствор **Агрокиллера** усиливает действие гербицида



Деймос

Эффективный препарат от злостных широколистных сорняков для очистки целинных участков, дорожек, газонов и др.

- уничтожает более 40 видов сорняков, в т.ч. амброзию, осоты, клевер, марь, борщевик Сосновского и др.
- вызывает гибель сорняков, устойчивых к гербицидам из других химических классов
- имеет высокую скорость проникновения
- полностью разлагается в почве за период вегетации

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	40 мл, 500 мл (флакон) – от сорняков на газонах; 90 мл, 900 мл (флакон) – от злостных сорняков
Действующее вещество	480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли, ВРК

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ ИЛИ ПОСАДКУ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	30 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1
 ГАЗОНЫ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	20 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1
 ГАЗОНЫ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ МОЛОДЫЕ ИЛИ ОСЛАБЛЕННЫЕ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	10 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1

! Флаконы 40 и 500 мл рекомендуются для обработки газонов; флаконы 90 и 900 мл рекомендуются для обработки целинных участков.
!! Добавление препарата **Адью** в раствор **Деймоса** усиливает действие гербицида



Деймос + Миура®

avgust crop protection

Двойной удар по сорнякам

- уничтожают более 90 видов сорняков
- обладают высокой скоростью проникновения в сорные растения
- полностью разлагаются в почве
- рекомендуются для очистки целинных участков
- применяется путём смешивания двух препаратов

Срок годности	5 лет (Деймос); 4 года (Миура)
Объём упаковки	45 мл + 12 мл (флаконы)
Действующее вещество	480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли, ВРК + 125 г/л хизалофоп-П-этила, КЭ

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
ДЕЙМОС, ВРК					
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	30 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1
МИУРА®, КЭ					
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков (в фазе 2-4 листьев у однолетних и при высоте многолетних 10-15 см)	8 мл/3 л воды	3 л/100 м²	1

! Упаковка рассчитана на обработку 150 м²: 12 мл Миура, КЭ + 45 мл Деймос, ВРК на 4,5 л воды
!! Добавление препарата **Адью** в раствор **Деймоса + Миуры** усиливает действие гербицидов



Миура®

avgust crop protection

Современный препарат для защиты овощных культур от злаковых сорняков

- эффективно уничтожает практически все виды злаковых сорняков, в т. ч. пырей, овсюг, плевел и др.
- действует избирательно, не оказывает отрицательного влияния на культурные растения
- ускоренно поглощается листьями и надземными частями сорняков, переносится к точкам роста побегов и корневищ, что способствует быстрой гибели сорной растительности

Срок годности	4 года
Объём упаковки	4 мл (ампула), 12 мл (флакон)
Действующее вещество	125 г/л хизалофоп-П-этила, КЭ

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, ЛУК (всех генераций)	Однолетние злаковые сорняки (виды щитовника, овсюг и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев	4 мл/5 л воды	5 л/100 м²	1	40
	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см	8 мл/5 л воды	5 л/100 м²	1	40
 МОРКОВЬ (в том числе для пучкового товара)	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев	4 мл/5 л воды	5 л/100 м²	1	20
	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см	8 мл/5 л воды	5 л/100 м²	1	20

! Добавление препарата **Адью** в раствор **Миуры** усиливает действие гербицида



Лазурит®

Незаменимое средство в борьбе с сорняками на картофеле

- уничтожает сорняки в момент их прорастания при довсходовом или в течение 10-20 суток при послевсходовом применении
- обеспечивает надёжную защиту на протяжении 1-2 месяцев
- не оказывает отрицательного влияния на картофель
- выпускается также в инновационной водорастворимой упаковке

Срок годности	водорастворимый пакет – 3 года, пакет – 5 лет
Объём упаковки	10 г (водорастворимый пакет), 20 г (пакет)
Действующее вещество	700 г/кг метрибузина, СП

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки (лебеда, марь (виды), амброзия, бодяк, щирица и др.)	Опрыскивание почвы до всходов культуры	10 г/3 л воды	3 л/100 м²	1	–
		Последовательное опрыскивание: первое – почвы до всходов культуры, второе – при высоте ботвы до 5 см	10 г/3 л воды (первое опрыскивание) 10 г/9 л воды (второе опрыскивание)	3 л/100 м² 9 л/300 м²	2	–

! Добавление препарата **Адью** в раствор **Лазурита** усиливает действие гербицида



Лазурит® Т

Драгоценный помощник в борьбе с сорняками на томатах

- применяется для борьбы со многими видами сорных растений
- обладает продолжительным периодом защитного действия
- эффективно подавляет проростки сорняков в почве
- имеет широкий диапазон применения

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	5 г (пакет)
Действующее вещество	700 г/кг метрибузина, СП

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТ рассадный	Однолетние злаковые и двудольные сорняки (амброзия, марь, лебеда, щирица, звездчатка и др.)	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт	10-12 г/3 л воды	3 л/100 м²	1	60
		Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт	10 г/3 л воды	3 л/100 м²	1	60
 ТОМАТ посевной	Однолетние злаковые и двудольные сорняки (амброзия, марь, лебеда, щирица, звездчатка и др.)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры	20 г/10 л воды	3 л/100 м²	1	60
		Последовательное опрыскивание: первое – в фазе 1-2 листьев культуры, второе – в фазе 3-5 листьев культуры	10 г/10 л воды (первое опрыскивание) 10 г/6 л воды (второе опрыскивание)	2 л/100 м² 3 л/100 м²	2	60

! Добавление препарата **Адью** в раствор **Лазурита Т** усиливает действие гербицида



Лонтрел®• 300Д

Уникальное средство для борьбы с однолетними и многолетними сорняками на газоне и в посадках земляники

- эффективно уничтожает все виды осотов, одуванчик, щавель и другие сорняки
- обладает избирательным механизмом действия: подавляет нежелательную сорную растительность, не повреждая газонную траву и землянику
- полностью уничтожает не только наземную часть, но и корневую систему сорняков

Срок годности	4 года
Объём упаковки	3 мл (ампула); 9 мл, 45 мл, 90 мл, 500 мл, 1 л (флакон)
Действующее вещество	300 г/л клопиралида, ВР

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ГАЗОНЫ	Однолетние двудольные сорняки (горцы, ромашка непахучая и др.)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса	1,5 мл/5 л воды	5 л/100 м²	1	–
	Однолетние, многолетние двудольные сорняки (одуванчик, подорожник, ромашка, щавель, тысячелистник и др.)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса	6 мл/5 л воды	5 л/100 м²	1	–
 ЗЕМЛЯНИКА	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные сорняки (ромашка непахучая, горцы)	Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая	3 мл/3 л воды	3 л/50 м²	1	–

! Добавление препарата **Адью** в раствор **Лонтрела-300Д** усиливает действие гербицида



Раундап®

Широкоизвестное средство для борьбы с сорной растительностью

- уничтожает однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
- используется для обработки приствольных кругов деревьев, а также при очистке обочин дорог, территорий вдоль заборов

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	50 мл, 140 мл, 500 мл, 1 л (флакон)
Действующее вещество	360 г/л глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли, ВР

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ПЛОДОВЫЕ, ЦИТРУСОВЫЕ, ВИНОГРАДНИКИ	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной и летом (при условии защиты культуры)	80 мл/10 л воды	5 л/100 м²	1	–
	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной и летом (при условии защиты культуры)	120 мл/10 л воды	5 л/100 м²	1	–
 УЧАСТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР (овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), А ТАКЖЕ ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ (семенные посевы)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период	80 мл/10 л воды	5 л/100 м²	1	–
	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период	120 мл/10 л воды	5 л/100 м²	1	–
 Картофель	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры	40-60 мл/10 л воды	5 л/100 м²	1	–
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ (ПОСАДКУ) КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (обочины дорог, вдоль изгороди и т. д.)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	80-120 мл/10 л воды	5 л/100 м²	1	–

! Добавление препарата **Адью** в раствор **Раундапа** усиливает действие гербицида



Торнадо®

Универсальное средство для борьбы со всеми видами сорняков

- высокая проникающая способность
- уничтожает более 155 видов сорных растений, в т. ч. вьюнок, бодяк, пырей и другие
- идеально подходит для обработки почвы перед посевом
- может использоваться во всем диапазоне температур, при которых растения жизнеспособны

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	5 мл (ампула); 10 мл (пакет); 50 мл, 100 мл, 500 мл, 1 л (флакон)
Действующее вещество	360 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль), ВР

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК/ СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ПЛОДОВЫЕ, ЦИТРУСОВЫЕ, ВИНОВАРНИКИ	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков при условии защиты культуры: однолетние – в ранние стадии роста (от 5 до 10-15 см высотой), многолетние – при высоте 10 см и выше	25-50 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1/–
	Злостные многолетние сорняки (пырей ползучий, свинорой, амброзия, бодяк, вьюнок и др.)	Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков при условии защиты культуры	75 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1/–
 УЧАСТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ (ПОСАДКУ) РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР (овощных, картофеля, однолетних цветочных и других)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период	50 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1/–
	Злостные многолетние (пырей ползучий, свинорой, амброзия, бодяк, вьюнок и др.)	Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период	75 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1/–
 ГАЗОНЫ (новые посевы)	Однолетние и многолетние сорняки, в т. ч. злостные	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 14 дней до посева газонных культур	50-75 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1/–
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ (ПОСАДКУ) КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (обочины дорог, изгородь и т.д.)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	25-50 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1/–
	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание вегетирующих сорняков	50-75 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1/–

! Добавление препарата **Адью** в раствор **Торнадо** усиливает действие гербицида.

Подробный перечень культур см. на упаковке



Хакер®

Высококонцентрированное средство избирательного действия для борьбы с сорняками на газоне

- обладает системным действием
- легко перемещается по растению, нарушая процесс деления клеток и прекращая его рост
- уничтожает различные виды сорняков, в т. ч. одуванчик, ромашку, бодяк, виды осота, паслён и др.
- подавляет рост сорняков уже в течение нескольких часов после обработки

Срок годности	3 года
Объём упаковки	2,5 г (пакет)
Действующее вещество	750 г/кг клопираллида, ВРГ

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ГАЗОНЫ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (одуванчик, подорожник, щавель, лютик и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков через 1-2 дня после первого укоса	2,5 г/5 л воды	5 л/100 м²	1

! Добавление препарата **Адью** в раствор **Хакера** усиливает действие гербицида



Регуляторы роста растений

Корень Супер®

Стимулятор корнеобразования
саженцев и черенков плодовых, ягодных,
декоративных культур

- способствует ускоренному формированию мощной корневой системы
- повышает приживаемость
- снимает стресс при высадке растений



Срок годности 3 года
Объём упаковки 5 г, 10 г (пакет)
Действующее вещество 5 г/кг 4(индол-3ил) масляной кислоты, ВРГ

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ,ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (черенки)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Обмакивание предварительно увлажненного нижнего среза черенка	10-20 мг/ черенок		1	–
		Замачивание корневой системы на 6 часов	1 г/1 л воды	1 л/растение	1	–
 ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (саженцы)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Полив под корень через 10 дней после высадки	1 г/1 л воды	0,5 л/растение	1	–



Расцвет®

Регулятор роста для стимуляции
плодообразования овощных культур

- уменьшает пустоцвет
- улучшает завязываемость плодов
- повышает урожайность и ускоряет созревание

Срок годности	2 года
Объём упаковки	0,5 г (ампула)
Действующее вещество	90 г/кг гиббереллиновых кислот натриевые соли, П

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТЫ <i>открытого и защищённого грунта</i>	Повышение урожайности, ускорение созревания, увеличение выхода плодов товарного вида	Опрыскивание растений в начале периода цветения первой, второй и третьей кисти	0,1 г/1 л воды	3 л/100 м²	3	–
 ОГУРЦЫ <i>открытого и защищ. грунта</i>	Повышение урожайности	Опрыскивание в начале фазы цветения и в период массового цветения	0,1 г/2 л воды	5 л/100 м²	2	–
 БАКЛАЖАНЫ	Повышение урожайности, ускорение созревания	Опрыскивание в фазе бутонизации и в начале фазы цветения	0,1 г/1 л воды	3 л/100 м²	3	–
 КАРТОФЕЛЬ	Повышение урожайности, увеличение выхода клубней товарного вида	Опрыскивание в начале периода массового цветения и повторно через 7 дней после первой обработки	0,1 г/2 л воды	3 л/100 м²	2	–
 КАПУСТА <i>ранняя</i>	Повышение урожайности, ускорение технической спелости, увеличение выхода товарных кочанов	Опрыскивание в фазе развития 6-8 листьев, в начале завязывания кочана и через 10-12 дней после второй обработки	0,1 г/1,5 л воды	3 л/100 м²	3	–
 КАПУСТА <i>поздняя</i>	Повышение урожайности, ускорение технической спелости, увеличение выхода товарных кочанов	Опрыскивание в фазе развития 6-8 листьев и повторно в начале фазы завязывания кочана	0,1 г/1,5 л воды	3 л/100 м²	2	–



Рэгги®

Регулятор роста растений от перерастания
рассады и образования усов у земляники

- предотвращает «вытягивание» рассады
- активизирует развитие корневой системы
- увеличивает толщину стебля, способствует формированию мощного приземистого куста
- уменьшает отрастание побегов (усов) у земляники
- улучшает декоративность цветов

Срок годности	2 года
Объём упаковки	1 мл (ампула); 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество	750 г/л хлормекватхлорида, ВРК

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТ, ПЕРЕЦ <i>(рассада)</i>	Активизация формирования корневой системы, предотвращение перерастания рассады, улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2-е и 3-е – с интервалом 5-8 дней	1 мл/1 л воды	300 мл/10 м²	3	–
		Полив растений под корень в фазе 3-4 листьев	1 мл / 1 л воды	30 мл/растение (3 л/1 м²)	1	–
 КАПУСТА <i>(рассада)</i>	Активизация формирования корневой системы, предотвращение перерастания рассады, улучшение качества рассады, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – в фазе семядольных листьев, 2-й и 3-й – с интервалом 7 дней	3 мл/1 л воды	1 л/1 м²	3	–
 ЗЕМЛЯНИКА	Повышение устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды, уменьшение отрастания побегов (усов), увеличение количества ягод, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в начале фазы бутонизации, 2-е – через 7 дней после первого опрыскивания	10 мл/1 л воды	300 мл/10 м²	2	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ <i>(горшечные растения)</i>	Активизация формирования корневой системы, снижение высоты растений, формирование компактного куста, повышение декоративных качеств, продление периода цветения	Полив растений: 1-й – в фазе сформированных, но ещё не окрашенных бутонов, 2-й – через 5-6 месяцев после первого полива	1 мл/100 мл воды	50-100 мл/растение	2	–



Рибав®•Экстра

Природный регулятор роста и корнеобразователь

- содержит уникальный комплекс биологически активных веществ
- обеспечивает 99% укореняемость любых культур,
- улучшает приживаемость растений при посадке и пересадке
- омолаживает старые растения
- усиливает ростовые процессы

Срок годности	3 года
Объём упаковки	0,5 мл, 1 мл (ампула)
Действующее вещество	0,00152 г/л L-аланина + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты, Р

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 КАРТОФЕЛЬ	Повышение полевой всхожести клубней, ранней и общей урожайности, устойчивости к фитофторозу и вирусным заболеваниям	Предпосадочная обработка клубней	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	1 л/100 кг	1
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	0,1 мл (3 капли)/3 л воды	3 л/100 м²	1
 ОГУРЕЦ (открытый и защищённый грунт)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 мин.	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	100 мл/100 г	1
		Полив под корень в фазе 3-4 настоящих листьев	1 мл/10 л воды	100 мл/1 растение	1
		Опрыскивание растений в фазе 4-5 настоящих листьев, через 2 недели после первого опрыскивания и перед цветением	0,1 мл (3 капли)/10 л воды	4 л/100 м²	3
 ТОМАТ	Повышение энергии прорастания и всхожести, увеличение урожайности	Предпосевная обработка семян	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
 ЛУК-ЧЕРНУШКА	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности	Предпосевная обработка семян	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
		Полив под корень через 1,5 месяца после посева	1 мл/10 л воды	4-5 л/10 м²	1
 ЛУК на репку	Ускорение роста, увеличение урожайности	Предпосадочная обработка лука-севка	0,2 мл (6 капель)/2 л воды	2 л/1 кг посадочного материала	1
		Полив под корень через 1,5 месяца после посева	1 мл/10 л воды	4-5 л/10 м²	1

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 СВЁКЛА столовая	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности	Предпосевная обработка семян	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
		Полив под корень в фазе 4-6 листьев	1 мл/10 л воды	4-5 л/10 м²	1
 ГОРОХ	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности зелёной массы и семян. Повышение устойчивости к болезням	Предпосевная обработка семян	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	0,03 мл (1 капля)/10 л воды	3 л/100 м²	1
 КАПУСТА	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 мин.	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
		Опрыскивание растений в фазе 3-5 настоящих листьев, через 2 недели после первого опрыскивания и в фазе завязывания кочана	0,1 мл (3 капли)/10 л воды	4 л/100 м²	3
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (бегония вечноцветущая, бегония клубневая, тагетес отклонённый, виола гибридная)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных характеристик растений	Полив почвы под сеянцами в фазе 2-3 настоящих листьев и рассады после пикировки	1 мл/10 л воды	4 л/1 м²	2
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	1 мл/10 л воды	4 л/100 м²	1
 ВИШНЯ, ГРУША, ЯБЛОНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА, ИРГА, ЖИМОЛОСТЬ, РЯБИНА КРАСНАЯ, АРОНИЯ, МАЛИНА, ЕЖЕВИКА, СИРЕНЬ, МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЙ ГИБРИД	Стимулирование корнеобразования, активизация ростовых процессов	Полив под корень при посадке (пересадке)	1 мл/10 л воды	1-5 л/растение	1
		Замачивание зелёных черенков или корневой системы саженцев, сеянцев на 18 часов	1 мл/10 л воды	–	1
 ЕЛЬ (сеянцы)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости, усиление ростовых процессов	Полив под корень в период интенсивного роста	0,2 мл (6 капель)/1 л воды	3 л/1 м²	1
		Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива	1 мл/1 л воды	6 л/100 м²	1
		Замачивание семян перед посевом на 18 часов	1 мл/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
 СОСНА (сеянцы)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости, усиление ростовых процессов	Полив под корень в период интенсивного роста	0,2 мл (6 капель)/1 л воды	3 л/1 м²	1
		Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива	1 мл/1 л воды	6 л/100 м²	1
		Замачивание семян перед посевом на 18 часов	0,2 мл (6 капель)/1 л воды	200 мл/100 г семян	1



Трафик®

Регулятор роста против прорастания лука и картофеля во время хранения

- подавляет образование проростков на срок до 9 месяцев
- проявляет активное действие уже через 24 часа после обработки
- применяется путём опрыскивания растений в период вегетации за 14-25 дней до сбора урожая

Срок годности	2 года
Объём упаковки	100 мл (флакон)
Действующее вещество	270 г/л малеинового гидразида (калиевая соль), ВРК

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЛУК РЕПЧАТЫЙ (на репку)	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении луковиц	Опрыскивание растений за 14-21 день до сбора урожая (при полегании – не более 50%)	90-120 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1	60
 КАРТОФЕЛЬ	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении клубней	Опрыскивание растений за 21-25 дней до сбора урожая (при размере сформировавшихся клубней не менее 25 мм)	120-150 мл/ 3 л воды	3 л/100 м²	1	60



Фитозонт®

ХВОЙНЫЙ

Специализированный высокоэффективный природный укоренитель

- обеспечивает 99% укореняемость хвойных культур
- улучшает приживаемость при посадке и пересадке
- усиливает ростовые процессы

Срок годности	3 года
Объём упаковки	1 мл (ампула), 10 мл (флакон)
Действующее вещество	0,00152 г/л L-аланина + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты, Р

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЕЛЬ	Улучшение приживаемости, усиление ростовых процессов	Полив под корень в период интенсивного роста	0,2 мл (6 капель)/1 л воды	3 л/1 м²	1
		Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива	1 мл/1 л воды	6 л/100 м²	1
 СОСНА	Улучшение приживаемости, усиление ростовых процессов	Полив под корень в период интенсивного роста	0,2 мл (6 капель)/1 л воды	3 л/1 м²	1
		Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива	1 мл/1 л воды	6 л/100 м²	1



Фитозонт®

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальный природный регулятор роста растений

- повышает энергию прорастания семян и приживаемость рассады
- улучшает цветение
- ускоряет рост и развитие растений
- увеличивает урожайность

Срок годности	3 года
Объём упаковки	1 мл (ампула)
Действующее вещество	0,00152 г/л L-аланина + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты, Р

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 КАРТОФЕЛЬ	Повышение полевой всхожести клубней, ранней и общей урожайности, устойчивости к фитофторозу и вирусным заболеваниям	Предпосадочная обработка клубней	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	1 л/100 кг	1
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	0,1 мл (3 капли)/3 л воды	3 л/100 м²	1
 ОГУРЕЦ (открытый и защищённый грунт)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 мин.	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	100 мл/100 г	1
		Полив под корень в фазе 3-4 настоящих листьев	1 мл/10 л воды	100 мл/1 растение	1
		Опрыскивание растений в фазе 4-5 настоящих листьев, через 2 недели после первого опрыскивания и перед цветением	0,1 мл (3 капли)/10 л воды	4 л/100 м²	3
 ТОМАТ	Повышение энергии прорастания и всхожести, увеличение урожайности	Предпосевная обработка семян	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
 СВЁКЛА столовая	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности	Предпосевная обработка семян	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
		Полив под корень в фазе 4-6 листьев	1 мл/10 л воды	4-5 л/10 м²	1

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЛУК-ЧЕРНУШКА	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности	Предпосевная обработка семян	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
		Полив под корень через 1,5 месяца после посева	1 мл/10 л воды	4-5 л/10 м²	1
 ЛУК на репку	Ускорение роста, увеличение урожайности	Предпосадочная обработка лука-севка	0,2 мл (6 капель)/2 л воды	2 л/1 кг посадочного материала	1
		Полив под корень через 1,5 месяца после посева	1 мл/10 л воды	4-5 л/10 м²	1
 КАПУСТА	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 мин.	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
		Опрыскивание растений в фазе 3-5 настоящих листьев, через 2 недели после первого опрыскивания и в фазе завязывания кочана	0,1 мл (3 капли)/10 л воды	4 л/100 м²	3
 ГОРОХ	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности зелёной массы и семян. Повышение устойчивости к болезням	Предпосевная обработка семян	0,1 мл (3 капли)/1 л воды	200 мл/100 г семян	1
		Опрыскивание растений в фазе бутонизации	0,1 мл (3 капли)/3 л воды	3 л/100 м²	1
 ВИШНЯ, ГРУША, ЯБЛОНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА, ЖИМОЛОСТЬ, РЯБИНА КРАСНАЯ, АРОНИЯ, МАЛИНА, ЕЖЕВИКА, МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЙ ГИБРИД, ИРГА	Стимулирование корнеобразования, активизация ростовых процессов	Замачивание зелёных черенков или корневой системы саженцев, сеянцев на 18 часов	1 мл/10 л воды	–	1
		Полив под корень при посадке (пересадке)	1 мл/10 л воды	1-5 л/растение	1
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (бегония вечноцветущая, бегония клубневая, тагетес отклонённый, виола гибридная)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных характеристик растений	Полив почвы под сеянцами в фазе 2-3 настоящих листьев и рассады после пикировки	1 мл/10 л воды	4 л/1 м²	2
		Опрыскивание рассады в фазе бутонизации	1 мл/10 л воды	4 л/100 м²	1
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (сирень и др.)	Стимулирование корнеобразования	Замачивание зелёных черенков или корневой системы саженцев, сеянцев на 18 часов	1 мл/10 л воды	–	1
		Полив под корень при посадке (пересадке)	1 мл/10 л воды	1-5 л/растение	1



Янтарин®

Природный регулятор роста плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур

- ускоряет сроки цветения и созревания
- увеличивает урожайность, улучшает качество продукции
- повышает устойчивость растений к поражению болезнями
- обладает антистрессовыми свойствами, оказывая положительное действие на растения в условиях засухи, жары, заморозков, излишней влажности
- улучшает усвоение питательных веществ из почвы

Срок годности 2 года
Объём упаковки 100 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество 5 г/л янтарной кислоты, ВРК

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ЗЕМЛЯНИКА	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период массового цветения	50 мл/ 4 л воды	4 л/100 м²	1	–
 ВИНОГРАД	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации	130 мл/ 10 л воды	10 л/100 м²	1	–
 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период массового цветения	50 мл/ 10 л воды	10 л/100 м²	1	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (однолетние)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных и декоративных характеристик растений	Полив растений под корень: первый – в фазе 2-х настоящих листьев, последующие – с интервалом 20 дней	15 мл/ 10 л воды	10 л/1 м²	4	–
 ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (многолетние)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных и декоративных характеристик растений	Полив растений под корень: первый – в фазе 2-х настоящих листьев, последующие – с интервалом 20 дней	30 мл/ 10 л воды	10 л/1 м²	3	–



Препараты от грызунов РОДЕНТИЦИДЫ



Зерноцин® НЕО

Эффективная зерновая приманка для борьбы с грызунами

- вызывает 100% гибель грызунов после однократного употребления приманки
- содержит привлекательные вещества, что обеспечивает максимальную поедаемость

Срок годности	3 года
Объём упаковки	100 г (пакет)
Действующее вещество	0,005% бромадиолона, зерно

ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 МЫШИ, ПОЛЁВКИ	Препарат помещают в ёмкости для раскладки приманок, на подложки, лотки до 50 г. Ёмкости и подложки с приманкой размещают в местах обитания грызунов, поблизости от их нор, на путях перемещения, вдоль стен и перегородок. К приманке, которая частично или полностью съедена, добавляют новую. Загрязнённую или испорченную приманку меняют на свежую. Ёмкости с нетронутой приманкой можно перенести в другое место.	20-50 г/лоток	Места раскладки осматривают через 1-2 дня, затем (при снижении интенсивности поедания препарата) – с интервалом в 1 неделю. Обработку проводят до исчезновения грызунов
 КРЫСЫ СЕРЫЕ, ЧЁРНЫЕ, ВОДЯНЫЕ	Препарат помещают в ёмкости для раскладки приманок, на подложки, лотки до 100 г. Ёмкости и подложки с приманкой размещают в местах обитания грызунов, поблизости от их нор, на путях перемещения, вдоль стен и перегородок. К приманке, которая частично или полностью съедена, добавляют новую. Загрязнённую или испорченную приманку меняют на свежую. Ёмкости с нетронутой приманкой можно перенести в другое место.	50-100 г/лоток	Места раскладки осматривают через 1-2 дня, затем (при снижении интенсивности поедания препарата) – с интервалом в 1 неделю. Обработку проводят до исчезновения грызунов



Рэтмэн®

Сильнодействующая приманка от грызунов

- обладает высокой эффективностью, вызывает гибель крыс и мышей после однократного поедания приманки
- обеспечивает превосходную поедаемость благодаря вкусовым добавкам
- применяется в быту и на дачном участке
- характеризуется избирательным действием, гарантируя безопасность для людей и домашних животных

Срок годности	2 года
Объём упаковки	50 г, 200 г (пакет)
Действующее вещество	0,005% бродифакума, Г

ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 МЫШИ, ПОЛЁВКИ	Поместить приманку в лотки или специально приспособленные ёмкости, которые необходимо разместить в места обитания грызунов: поблизости от их нор, на путях перемещения, вдоль стен и перегородок	10-20 г/лоток Расстояние между точками раскладки – от 2 до 10 м (зависит от численности грызунов)	Места раскладки осматривают через 1-2 дня, затем с интервалом в 1 неделю
 КРЫСЫ СЕРЫЕ, ЧЁРНЫЕ, ВОДЯНЫЕ	Поместить приманку в лотки или специально приспособленные ёмкости, которые необходимо разместить в места обитания грызунов: поблизости от их нор, на путях перемещения, вдоль стен и перегородок	30-50 г/лоток Расстояние между точками раскладки – от 2 до 10 м (зависит от численности грызунов)	Места раскладки осматривают через 1-2 дня, затем с интервалом в 1 неделю

Super-CAT®

Super-CAT®

Серия готовых приманок от грызунов

- обладают высокой родентицидной активностью
- смертельная доза может быть получена грызунами в результате однократного поедания приманки
- вызывают 100% гибель крыс и 90% гибель мышей в течение 4-8 суток
- уничтожают даже чувствительных и устойчивых к другим антикоагулянтам грызунов



Срок годности	3 года
Объём упаковки	48 г (пакет, твёрдые брикеты); 100 г (пакет, гранулы); 100 г (пакет, мягкие брикеты); 100 г (пакет, зерно)
Действующее вещество	0,005% бромадиолона

ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 КРЫСЫ, ДОМОВЫЕ МЫШИ, ПОЛЁВКИ	Приманку (твёрдые брикеты/мягкие брикеты/гранулы/зерно) помещают в небольшие ёмкости, специальные контейнеры, на подложки из плотной бумаги, полиэтилена, пластика и раскладывают в местах обитания крыс и домашних мышей. В помещениях ёмкости с приманкой размещают на путях перемещения грызунов и прежде всего в углах, вдоль стен и перегородок, под мебелью, вблизи нор.	20 г/лоток (мыши), 50 г/лоток (крысы) Расстояние между местами раскладки от 1 до 5 м (зависит от площади помещений, а также вида и численности грызунов)	Приманку восполняют по мере поедания. При высокой численности грызунов приманку раскладывают часто и небольшими порциями



Комплексные удобрения

Гумат®+7 ЙОД

Удобрение на основе гуминовых кислот для предпосевной обработки и подкормки растений

- увеличивает всхожесть и энергию прорастания семян
- улучшает структуру и повышает плодородие почвы
- обеспечивает получение высоких урожаев
- способствует накоплению плодами питательных веществ и витаминов
- экономично: 10 г препарата на 100 л воды

Срок годности	10 лет
Объём упаковки	25 г (пакет)
Действующее вещество	смесь калиевых и/или натриевых солей гуминовых кислот – 75%, К – 5%, медь – 0,2%, Zn – 0,2%, Mn – 0,17%, I – 0,005%, Mo – 0,018%, Co – 0,02%, Fe – 0,4%, B – 0,2%

КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Предпосевное замачивание семян на 14-24 часа, луковиц на 6-8 часов	0,5-1 г/л воды	–	1
	Корневая подкормка в течение периода вегетации с интервалом в 14-15 дней, начиная с фазы появления всходов или высадки рассады	1,5-2 г/10 л воды	4-5 л/1 м²	3-4
 ЦВЕТочНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Предпосевное замачивание семян на 14-24 часа, луковиц на 6-8 часов, саженцев на 2-3 часа, черенков на 24 часа	0,5-1 г/1 л воды	–	1
	Корневая подкормка в течение периода вегетации с интервалом в 7-10 дней, начиная с фазы появления всходов или высадки рассады	1,5-2 г/10 л воды	4-5 л/1 м²	5-6
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Корневая подкормка в период активного роста с марта по сентябрь: 1 раз в 10-15 дней, с октября по февраль: 1 раз в 1-1,5 месяца	1,5-2 г/10 л воды	100-200 мл/ молодое растение, 1-1,5 л/взрослое	2-3
 ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ	Замачивание черенков на 24 часа, саженцев с открытой корневой системой на 2-3 часа	0,5-1 г/1 л воды	–	1
	Корневая подкормка осенью или при посадке	3 г/10 л воды	10-50 л/растение	–
	Подкормка в течение периода вегетации с интервалом в 10-15 дней, начиная с фазы возобновления вегетации	1,5-2 г/10 л воды	10-50 л/растение (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м² кустарников, 2-10 л/дерево (некорневая подкормка)	3-4
 ЗЕМЛЯНИКА	Подкормка с интервалом 10-15 дней в фазу возобновления вегетации и после сбора урожая	0,5-2 г/10 л воды	4-5 л/1 м² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	1-2

Подробные рекомендации по применению см. на упаковке



АМИНОЗОЛ

Жидкое органическое азотное удобрение из продуктов животного происхождения с полным комплексом аминокислот

- повышает урожайность
- стимулирует рост растений
- защищает от стрессов
- улучшает деление клеток и развитие корневой системы
- помогает усваивать питательные вещества целыми «строительными блоками»

Срок годности	2 года
Объём упаковки	5 мл (пластиковая ампула); 500 мл (флакон)
Действующее вещество	N – 9%; аминокислоты – 55%, P

КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Замачивание семян на 12-24 часа, корневой системы рассады перед посадкой на 1-2 часа	5 мл/500 мл воды	–	1
	Полив под корень при посадке	5 мл/500 мл воды	0,05-2 л/растение (зависит от размеров)	1
	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 КАРТОФЕЛЬ	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4

КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Замачивание корневой системы саженцев перед посадкой на 1-2 часа	5 мл/500 мл воды	–	1
	Полив под корень при посадке	5 мл/500 мл воды	0,05-2 л/растение (зависит от размеров)	1
	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	10-20 л/растение (корневая подкормка); 1,5-2 л/10 м² кустарников, 2-10 л/дерево (некорневая подкормка)	3-6
 ЗЕМЛЯНИКА	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ	Подкормка в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ЦВЕТОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Замачивание семян на 12-24 часа. Замачивание корневой системы рассады (саженцев) перед посадкой на 1-2 часа.	5 мл/500 мл воды	–	1
	Полив под корень при посадке	5 мл/500 мл воды	0,05-2 л/растение (зависит от размеров)	1
	Подкормка цветочных культур в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка) 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
	Подкормка декоративных культур в течение сезона с интервалом 15-20 дней	5 мл/1 л воды	10-20 л/растение (корневая подкормка); 1,5-2 л/10 м² кустарников, 2-10 л/дерево (некорневая подкормка)	3-6
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (защищенный грунт), ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Подкормка	5 мл/2 л воды	до смачивания земляного кома (корневая подкормка); до равномерного смачивания всей поверхности листьев (некорневая подкормка)	1 раз/7-10 дней (март – октябрь), 1 раз/месяц (ноябрь – февраль)



МикроМикс®

Корнепитатель – Цветы

Комплексное удобрение длительного действия с микроэлементами

- обеспечивает непрерывное локальное поступление питательных веществ в растения
- исключает передозировку
- улучшает декоративные качества цветочных культур
- применяется также для подкормки комнатных цветов

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	5 x 10 г (водорастворимые пакетики)
Действующее вещество	N – 12%; P – 8%; K – 18%; Mg – 2,5% + микроэлементы

КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ	При высадке рассады в грунт 1 пакетик удобрения положить на дно лунки, присыпать почвой слоем 5-7 см, затем посадить растение и полить. Далее проводится обычный уход и полив.
	Размещение удобрения к уже высаженной рассаде следует проводить сбоку на глубину не менее 7-10 см и не ближе 15-20 см от стеблей (осторожно, чтобы не повредить корни), присыпать землёй. Далее обычный уход и полив.
 МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ (пионы, астильбы, хосты, лилейники и пр.)	Рано весной положить пакетик в почву на глубину не менее 7-10 см и не ближе 20-30 см от стеблей (осторожно, чтобы не повредить корни), присыпать землёй. В зависимости от возраста и вегетативной массы размещают 2-3 до 5 (максимум 10 для старых мощных кустов) пакетиков удобрения, равномерно вокруг кустов. Далее обычный уход и полив.
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (розы, сирень, лапчатки, спиреи и др.)	В зависимости от возраста и вегетативной массы 2-3 до 6 (максимум 10 для старых мощных кустов и деревьев) пакетиков удобрения равномерно размещают вокруг растений, не ближе 20-40 см от стволов. Далее обычный уход и полив.
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	При посадке или пересадке цветов на дренаж, присыпанный почвой слоем 4-6 см, помещают пакетик, засыпают почвой 4-6 см и сажают растения. Удобрение применяют из расчета 1 пакетик на контейнер 12-15 л. Далее обычный уход и полив.

При раскладке пакетики не вскрывать!



Лебозол КАЛИЙ⁴⁵⁰

Незаменимое удобрение для летней и осенней подкормки различных культур

- увеличивает содержание сахаров и витаминов в плодах и корнеплодах
- повышает зимостойкость плодовых, ягодных культур, декоративных деревьев и кустарников
- необходим в период плодообразования

Срок годности	2 года
Объём упаковки	5 мл (ампула), 500 мл (флакон)
Действующее вещество	N – 3%; K – 31%, P

КУЛЬТУРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Подкормка растений с интервалом 10-15 дней во второй половине вегетационного периода	2,5-5 мл/ 1 л воды	4-10 л/1 м ² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м ² (некорневая подкормка)	2-3
 КАРТОФЕЛЬ	Подкормка растений с интервалом 10-15 дней во второй половине вегетационного периода	2,5-5 мл/ 1 л воды	4-10 л/1 м ² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м ² (некорневая подкормка)	2-3
 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Подкормка растений с интервалом 10-15 дней в период плодообразования и после сбора урожая	2,5-5 мл/ 1 л воды	10-20 л/растение (корневая подкормка); 1,5-2 л/10 м ² кустарников, 2-10 л/дерево (некорневая подкормка)	2-3
 ЗЕМЛЯНИКА	Подкормка растений с интервалом 10-15 дней во второй половине вегетационного периода	2,5-5 мл/ 1 л воды	4-10 л/1 м ² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м ² (некорневая подкормка)	2-3
 ВИНОГРАД	Подкормка растений с интервалом 10-15 дней в период плодообразования и после сбора урожая	2,5-5 мл/ 1 л воды	10-20 л/растение (корневая подкормка); 1,5-2 л/10 м ² (некорневая подкормка)	2-3
 ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ	Подкормка растений с интервалом 10-15 дней во второй половине вегетационного периода	2,5-5 мл/ 1 л воды	4-10 л/1 м ² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м ² (некорневая подкормка)	2-3
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Подкормка растений с интервалом 10-15 дней во второй половине вегетационного периода	2,5-5 мл/ 1 л воды	4-10 л/1 м ² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м ² (некорневая подкормка)	2-3
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (горшечные растения)	Подкормка растений	2,5-5 мл/ 1 л воды	до смачивания земляного кома (корневая подкормка); до смачивания поверхности листьев (некорневая подкормка)	1 раз/7-10 дней (март – октябрь), 1 раз/месяц (ноябрь – февраль)



МикроМикс®

Водорастворимое комплексное бесхлорное удобрение с микроэлементами

- содержит сбалансированный состав элементов питания с микроэлементами
- обеспечивает получение высоких урожаев, ускоряет рост и развитие растений
- применяется для подкормки овощных, плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур в комнате, на балконе и даче
- не содержит хлора и тяжёлых металлов

Срок годности	3 года
Объём упаковки	20 г, 100 г (пакет)
Действующее вещество	N – 11%, P – 11%, K – 21%, Mg – 2,5% + микроэлементы

КУЛЬТУРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Подкормка растений через 7-10 дней после посадки (или появления всходов), последующие с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ЛУК И ЧЕСНОК	Корневая подкормка через 7-10 дней после появления всходов, последующие с интервалом 10-15 дней. Полив прекращают за 15-20 дней до уборки	20 г/10 л воды	5-10 л/м²	3-4
 КАРТОФЕЛЬ	Подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов, последующие с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4

КУЛЬТУРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 РЕДИС И ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ (укроп, лук на перо, салат и др., кроме посевов на семена)	Подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов, последующие – с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ЯБЛОНИ, ГРУШИ И ДР.	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, последующие – с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК, МАЛИНА, ВИШНЯ И ДР.	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, последующие – с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ЗЕМЛЯНИКА	Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, последующие с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ в открытом грунте	Подкормка многолетних растений весной в начале возобновления вегетации, последующие с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
	Подкормка растений через 7-10 дней после посадки (или появления всходов), последующие с интервалом 10-15 дней	20 г/10 л воды	5-10 л/м² (корневая подкормка) 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
 КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Подкормка растений	2 г/1 л воды	до увлажнения земляного кома (корневая подкормка); до увлажнения поверхности листьев (некорневая подкормка)	1 раз/7-10 дней (март – октябрь), 1 раз/месяц (ноябрь – февраль)

Примечание: 15-20 г удобрения соответствуют 1 столовой ложке. Подробные рекомендации по применению см. на упаковке.



Лебозол НУТРИПЛАНТ⁸⁻⁸⁻⁶

Комплексное минеральное удобрение
с микроэлементами в легкоусвояемой форме
для весенней подкормки

- повышает урожайность
- способствует гармоничному развитию растений, усилению цветения и плодообразования
- содержит вещества, повышающие эффективность некорневых подкормок

Срок годности 2 года
Объём упаковки 5 мл (ампула), 500 мл (флакон)
Действующее вещество N – 8%; P – 8%; K – 6%; B – 0,01%; Cu EDTA – 0,005%; Mn EDTA – 0,01%; Zn EDTA – 0,01%, P

КУЛЬТУРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Подкормка растений с интервалом 10-15 дней с начала возобновления вегетации весной до начала образования плодов	2,5-5 мл/ 1 л воды	10-20 л/растение (корневая подкормка); 1,5-2 л/10 м² кустарников, 2-10 л/дерево (некорневая подкормка)	2-3
 КАРТОФЕЛЬ	Подкормка растений через 1-2 недели после высадки рассады или появления всходов с интервалом 10-15 дней	2,5-5 мл/ 1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	2-3
 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Подкормка растений с интервалом 10-15 дней с начала возобновления вегетации весной до начала образования плодов	2,5-5 мл/ 1 л воды	10-20 л/растение (корневая подкормка); 1,5-2 л/10 м² кустарников, 2-10 л/дерево (некорневая подкормка)	2-3
 ЗЕМЛЯНИКА	Подкормка растений с интервалом 10-15 дней во второй половине вегетационного периода	2,5-5 мл/ 1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	2-3
 ВИНОГРАД	Подкормка растений с интервалом 10-15 дней в период плодообразования и после сбора урожая	2,5-5 мл/ 1 л воды	10-20 л/растение (корневая подкормка); 1,5-2 л/10 м² (некорневая подкормка)	2-3
 ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ	Подкормка растений через 1-2 недели после появления всходов с интервалом 10-15 дней	2,5-5 мл/ 1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	2-3
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Подкормка растений через 1-2 недели после высадки рассады или появления всходов с интервалом 10-15 дней	2,5-5 мл/ 1 л воды	4-10 л/1 м² (корневая подкормка); 1-1,5 л/10 м² (некорневая подкормка)	2-3
 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (горшечные растения)	Подкормка растений	2,5-5 мл/ 1 л воды	до смачивания земляного кома (корневая подкормка); до смачивания поверхности листьев (некорневая подкормка)	1 раз/7-10 дней (март – октябрь), 1 раз/месяц (ноябрь – февраль)

Серия «БАУ»

Препараты полностью
готовые к применению



Биотлин® БАУ

avgust crop protection

Готовый к применению препарат от тли на овощных и ягодных культурах

- уничтожает тлю и тепличную белокрылку уже через несколько часов после опрыскивания
- имеет длительный защитный период, благодаря системному действию

Срок годности	2 года
Объём упаковки	700 мл (флакон с курковым распылителем, с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество	0,1 г/л имидаклоприда, ВР

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОГУРЦЫ И ТОМАТЫ <i>защищённого грунта</i>	Тли, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	Разбавление водой не требуется	700 мл/7 м²	1	3
 СМОРОДИНА <i>(все виды)</i>	Тли	Опрыскивание до цветения	Разбавление водой не требуется	700 мл/1,5-7 кустов (зависит от размеров)	1	–
 КАРТОФЕЛЬ	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	Разбавление водой не требуется	700 мл/35 м²	1	20



avgust crop protection

Цветолюкс® БАУ

Готовый к применению препарат от тли, трипсов, белокрылки на цветочных и декоративных культурах

- защищает от сосущих вредителей уже через несколько часов после опрыскивания
- благодаря системному действию, предотвращает появление новых поколений вредителей

Срок годности	2 года
Объём упаковки	700 мл (флакон с курковым распылителем, с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество	0,1 г/л имидаклоприда, ВР

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ <i>открытого и защищённого грунта</i>	Тли, трипсы, цикадки, тепличная белокрылка	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении вредителей	Разбавление водой не требуется	700 мл/7 м² (до полного смачивания листовой пластины)	2
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Тли, трипсы, белокрылки	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении вредителей	Разбавление водой не требуется	700 мл/1,5-7 кустов (зависит от размеров; до полного смачивания листовой пластины)	2
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ	Тли, трипсы, белокрылки	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении вредителей	Разбавление водой не требуется	700 мл/1 дерево (до полного смачивания листовой пластины)	2



Чистоцвет® БАУ

avgust crop protection

Готовый к применению препарат от комплекса болезней цветочных и декоративных культур

- защищает в течение 4-5 недель после обработки
- не токсичен для растений
- не смывается дождём уже через 2 часа после опрыскивания

Срок годности	3 года
Объём упаковки	700 мл (флакон с курковым распылителем, с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество	0,7 г/л пропиконазола, ВР

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ открытого грунта	Мучнистая роса, ржавчина, пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	Разбавление водой не требуется	700 мл/7-28 растений (зависит от размеров)	1
 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Мучнистая роса, пятнистости	Опрыскивание в период вегетации	Разбавление водой не требуется	700 мл/1-7 кустов (зависит от размеров)	1
 РОЗЫ	Чёрная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней	Разбавление водой не требуется	700 мл/7-14 растений (зависит от размеров)	2



Торнадо® БАУ

avgust crop protection

Единственный гербицид сплошного действия полностью готовый к применению

- рекомендован для борьбы со всеми видами однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков
- обеспечивает защиту от многолетних сорняков в течение вегетационного периода

Срок годности	3 года
Объём упаковки	700 мл (флакон с курковым распылителем, с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество	8,8 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль), ВР

КУЛЬТУРА	СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
 ПЛОДОВЫЕ, ЦИТРУСОВЫЕ, ВИНОГРАДНИКИ	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии их роста (высотой от 5 до 10-15 см) при условии защиты культуры	0,7 л/70 м²	1
		Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии их роста (высотой от 10 см и выше) при условии защиты культуры	1,4 л/70 м²	1
 УЧАСТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩНЫХ, БОБОВЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ, МАСЛИЧНЫХ, БАХЧЕВЫХ, ЦВЕТОЧНЫХ, ДЕКОРАТИВНЫХ, ГАЗОННЫХ И ДРУГИХ КУЛЬТУР	Злостные многолетние сорняки (пырей ползучий, бодяк полевой и др.)	Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам при условии защиты культуры	2,1 л/70 м²	1
	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период	1,4 л/70 м²	1
 УЧАСТКИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ПОСЕВ ИЛИ ПОСАДКУ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ (садовые дорожки, вдоль изгороди и т.д.)	Злостные многолетние сорняки (пырей ползучий, свинорой, амброзия, бодяк полевой, вьюнок полевой и др.)	Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период	2,1 л/70 м²	1
	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков	0,7-1,4 л/70 м²	1
 ГАЗОНЫ (новые посевы)	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание вегетирующих сорняков	1,4-2,1 л/70 м²	1
	Однолетние и многолетние сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков высотой 5-15 см за 10-14 дней до посева газонных трав	1,4 л/70 м²	1
	Злостные однолетние и многолетние сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков высотой 5-15 см за 10-14 дней до посева газонных трав	2,1 л/70 м²	1

Разбавление водой не требуется

АО Фирма «Август» предлагает серию препаратов **«Двойная защита»**, которая создана специально для комплексной обработки плодовых, ягодных, цветочных и декоративных культур. В каждой упаковке содержатся два наиболее эффективных препарата, один из которых предназначен для борьбы с вредителями, второй – для лечения и профилактики болезней.

«Двойная защита» профессионально защитит ваши растения!

Серия «Двойная защита»

НАБОРЫ ИЗ ДВУХ
ПРЕПАРАТОВ

- **Выгодная покупка**
- **Комплексное решение**

*Препарат
для защиты
от болезней
растений*



**Чистоцвет +
Алиот**

Защита цветов
от мучнистой росы,
пятнистостей
и от комплекса
вредителей

*Препарат
для защиты
от насекомых-
вредителей*

Инструкции по применению препаратов внутри упаковки

Раёк + Биотлин

Защита сада от парши, мучнистой росы и от тли, цветоеда



Раёк + Клещевит

Защита сада от парши, мучнистой росы и от всех видов клещей

Чистоцвет + Биотлин

Защита цветов от мучнистой росы, пятнистостей и от трипсов, цикадок, тли



Чистоцвет + Клещевит

Защита цветов от мучнистой росы, пятнистостей, гнилей и от клещей

Раёк + Алиот

Защита сада от парши, мучнистой росы и от комплекса вредителей



Раёк + Сэмпай

Защита сада от парши, мучнистой росы и от яблонной плодовой жорки

Топаз + Биотлин

Защита смородины от мучнистой росы и от всех видов тли



Топаз + Клещевит

Защита смородины от мучнистой росы и от всех видов клещей



Серия
«Биоземледелие»

БИОПРЕПАРАТЫ

Бактофит®

Биологический препарат для борьбы с болезнями овощных и цветочных культур

- гарантирует получение экологически чистой, безопасной для здоровья продукции
- способствует развитию полезной микрофлоры
- не вызывает привыкания у фитопатогенов

Срок годности	2,5 года
Объём упаковки	10 г (пакет)
Действующее вещество	Bacillus subtilis, штамм ИПМ-215, БА-10000 ЕД/г, титр не менее 2 млрд. спор/г, СП



КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОГУРЕЦ защищённого грунта	Корневые гнили	Замачивание семян перед посевом в течение 3-6 часов с последующим просушиванием	2 г/1 л воды	100-150 мл/100 г семян	1	–
 ГВОЗДИКА защищённого грунта	Фузариоз	Замачивание черенков в течение 15 минут перед посадкой	1 г/1 л воды	1 л/500-1000 черенков	1	–
 РОЗА защищённого грунта	Мучнистая роса	Замачивание черенков в течение 15 минут перед посадкой	1-3 г/1 л воды	1 л/500-1000 черенков	1	–
		Опрыскивание в период вегетации	7 г/1 л воды	1 л/10 м²	2	–



avgust crop protection

Битоксибациллин®

Биопрепарат для борьбы с вредителями на овощных, ягодных, плодовых и декоративных культурах

- гарантирует получение экологически чистой, безопасной для здоровья продукции
- может применяться в любую фазу развития растений
- действует избирательно в отношении широкого спектра вредителей
- не накапливается в плодах

Срок годности	1,5 года
Объём упаковки	20 г (пакет)
Действующее вещество	Споро-кристаллический комплекс <i>Bacillus thuringiensis var thuringiensis</i> , БА не менее 1500 ЕА/мг, титр не менее 20 млрд. спор/г, П

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАРТОФЕЛЬ, ТОМАТЫ, ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ	Колорадский жук	Опрыскивание в период массового появления личинок 1-2 возрастов Интервал между обработками при температуре выше +20 °С – 6-7 дней, при температуре ниже +20 °С – 8-10 дней	40-100 г/10 л воды	0,5-1,5 л/10 м²	3-4	5

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ОГУРЦЫ защищённого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15–17 дней	80-100 г/10 л воды	1-3 л/10 м²	6	5
 КАПУСТА, МОРКОВЬ, СВЁКЛА	Капустная совка, луговой мотылёк	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней	40-50 г/10 л воды	0,5-1 л/10 м²	2	5
 ЯБЛОНЯ, СЛИВА, ГРУША, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКОС	Яблонная и плодовая моль, боярышница, яблонная плодожорка, листовёртки, американская белая бабочка, пяденицы, шелкопряды	Опрыскивание в период вегетации при появлении гусениц 1-3 возраста против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней	40-80 г/10 л воды	2-5 л/дерево (зависит от возраста и сорта дерева)	2	5
 СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК	Листовёртки, крыжовниковая огнёвка, пяденицы, пилильщики, листовая галлица, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации при появлении гусениц 1-3 возраста против каждого поколения вредителей с интервалом 7-10 дней	80-100 г/10 л воды	0,5-2 л/куст (зависит от возраста и сорта)	2	5
 ВИНОГРАД	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание через 8-10 дней после начала лёта бабочек против каждого поколения вредителей с интервалом 5-7 дней	60-80 г/10 л воды	2-5 л/куст (зависит от возраста и типа формирования куста)	2	5
 ХМЕЛЬ	Хмелевая тля, листогрызущие совки, стеблевой и луговой мотыльки	Опрыскивание в период вегетации при появлении гусениц 1-3 возраста против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней	40-50 г/10 л воды	2 л/10 м²	2	5
 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ	Листовёртки, моли, совки, луговой мотылёк	Опрыскивание в период вегетации при появлении гусениц 1-3 возраста против каждого поколения вредителей с интервалом 6-10 дней	50-70 г/10 л воды	0,5-2 л/10 м²	2	5



Лепидоцид®

Биопрепарат для борьбы с гусеницами на овощных, ягодных, плодовых и декоративных культурах

- гарантирует получение экологически чистой, безопасной для здоровья продукции
- позволяет производить обработку незадолго до сбора урожая

Срок годности	1,5 года
Объём упаковки	20 г (пакет)
Действующее вещество	Споро-кристаллический комплекс <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , БА не менее 3000 ЕА/мг, титр не менее 60 млрд. спор/г, П

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 КАПУСТА, МОРКОВЬ, СВЕКЛА	Капустная и репная белянки, капустная моль, огнёвки, капустная совка, луговой мотылёк	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней	20-30 г/10 л воды	0,5-1 л/10 м ²	2	5
 ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	Яблонная и плодовая моли, американская белая бабочка, шелкопряды, златогузка, листовёртка, боярышница	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней	20-30 г/10 л воды	2-5 л/дереву (зависит от возраста и сорта дерева)	2	5
 ЯБЛОНЯ	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 10-14 дней	20-30 г/10 л воды	2-5 л/дереву (зависит от возраста и сорта дерева)	3	5
 ВИНОГРАД	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней	20-30 г/10 л воды	2-10 л/10 м ²	2	5
 СМОРОДИНА, МАЛИНА, ЗЕМЛЯНИКА, КРЫЖОВНИК, ЧЕРНО-ПЛОДНАЯ РЯБИНА	Смородинная листовёртка, крыжовниковая огнёвка, пяденицы, пилильщики (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней	20-30 г/10 л воды	2-10 л/куст	2	5
 РОЗА ЭФИРОМАСЛИЧНАЯ	Пяденицы, листовёртки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней	20-30 г/10 л воды	2-10 л/10 м ²	2	5
 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ	Листовёртки, моли, златогузки, луговой мотылёк (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителей с интервалом 7-8 дней	20-30 г/10 л воды	2-10 л/10 м ²	2	5



Фитолавин®

Биологический препарат для борьбы с бактериальными и грибными болезнями овощных и плодовых культур

- гарантирует получение экологически чистой безопасной для здоровья продукции
- эффективен против корневых гнилей, монилиоза, бактериозов, пятнистостей и др.
- можно применять за 2 дня до сбора урожая

Срок годности	1 год
Объём упаковки	50 мл (флакон)
Действующее вещество	БА 120 000 ЕА/мл, 32 г/л фитобактериомицина – комплекс стрептотрициновых антибиотиков, ВРК

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ТОМАТ защищённого грунта	Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля	Полив рассады под корень: первый – в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней	20 мл/10 л воды	30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/растение (на постоянном месте)	2	2
 ТОМАТ открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, альтернариоз, чёрная бактериальная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней	20 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	2	–
 ОГУРЕЦ защищённого грунта	Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное и трахеомикозное увядание	Полив рассады под корень: первое – в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней	20 мл/10 л воды	30-50 мл/растение (рассада); 100-200 мл/растение (на постоянном месте)	2	2
 ОГУРЕЦ открытого грунта	Угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации: первое – через 7-10 дней после высадки растений на постоянное место, последующие – с интервалом 2-3 недели	20 мл/10 л воды	10 л/100 м ²	1-2	2
 ЯБЛОНЯ	Бактериальный ожог, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: в фазы обособления бутонов, цветения, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром до 4-5 см	20 мл/10 л воды	2-5 л/дереву (зависит от возраста и сорта дерева)	4	2



Экогель®

Полифункциональный агроэкологический активатор роста, цветения, болезнеустойчивости и урожайности различных культур

- способствует ускоренному плодоношению
- улучшает внешний вид декоративных культур
- ускоряет акклиматизацию и приживаемость импортных растений
- повышает устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды

Срок годности 2 года
Объём упаковки 50 мл (флакон)
Действующее вещество 30 г/л лактата хитозана, ВР

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК	СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)
 ПЛОДОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ, ОВОЩНЫЕ, ЦВЕТочно-ДЕКОРАТИВНЫЕ, КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Агроэкологический активатор корнеобразования, роста, цветения, болезнеустойчивости и урожайности	Замачивание семян в течение 2-4 часов	25 мл/1 л воды	1	–
		Замачивание оснований черенков, клубней, луковиц, корневищ в течение 12 часов перед высадкой в грунт	25 мл/1 л воды	1	–
		Полив рассады	50 мл/2 л воды	1 раз/неделю	–
		Полив растений в период вегетации	50 мл/2 л воды	Первый полив – весной в начале возобновления роста или сразу после посева, последующие – с интервалом в 4 недели в течение всей вегетации	–
		Опрыскивание растений равномерно смачивая листья	25 мл/2 л воды	Через 2 недели после каждого полива	–
		Полив под корень растений с опушёнными листьями	25 мл/2 л воды	С интервалом между обработками в 3 недели	–

Раствор использовать в том же объёме, что и воду при обычном поливе



Препараты бытовой химии
Инсектициды

Бытовая химия

Специальная серия препаратов бытовой химии разработана для надёжной защиты дома и приусадебного участка от широкого спектра насекомых



В неё входят средства:

- от иксодовых клещей
- от клопов
- от комаров и гнуса
- от тараканов, чешуйниц, мокриц
- от домовых и садовых муравьёв
- от ос
- от всех видов мух и других насекомых в помещениях





Клещевит® Супер

**Для очистки территорий
от иксодовых клещей**

- применяется на приусадебных, дачных и садовых участках, в том числе на участках, располагающихся рядом с лесом
- начинает действовать уже через 30 минут после обработки
- защищает на срок 1-1,5 месяца
- малотоксичен для птиц и дождевых червей, не представляет опасности для почвенных микроорганизмов

Срок годности: 3 года
Объём упаковки: 100 мл (флакон)
Действующее вещество: 25% циперметрина



Клещевит® Супер СПРЕЙ

**Для обработки одежды
от иксодовых клещей, блох**

- отлично подходит для защиты от насекомых во время отдыха на природе, прогулок по лесу
- не просто отпугивает, а уничтожает насекомых
- защитное действие – до 15 суток

Срок годности: 2 года
Объём упаковки: 100 мл (флакон)
Действующее вещество: 0,25% альфациперметрина

НОВИНКА
2018



Клопоед®

**Для уничтожения постельных клопов
и других насекомых**

- используется для обработки мест обитания клопов: щели в стенах, полу и мебели, за плинтусами, подоконники, обратные стороны картин, ковров, места отхождения обоев и т.д.
- не имеет сильного запаха
- гибель насекомых наступает на 2 день после обработки
- гарантирует длительный (около месяца) защитный эффект
- отсутствует привыкание у насекомых

Срок годности: 4 года
Объём упаковки: 100 мл (флакон)
Действующее вещество: 18,2% имидаклоприда



Комароед®

**От комаров, их личинок
и других видов гнуса**

- применяется путём опрыскивания мест посадки и днёвки насекомых: стены подвалов, сараев, низкие кусты, прибрежная растительность, непроточные непитьевые водоёмы, искусственные прудики
- эффективно снижает популяцию различных видов гнуса

Срок годности: 3 года
Объём упаковки: 100 мл (флакон)
Действующее вещество: 25% циперметрина



Кукарача®

От тараканов, чешуйниц и мокриц

- применяется на кухнях, в комнатах, ванных, подвалах и подсобных помещениях
- содержит пищевые привлекатели
- действует по принципу «эпидемии» – насекомые, после соприкосновения с гранулами, переносят препарат на других особей, вызывая гибель всей колонии
- гибель насекомых наступает через 2–3 суток
- гранулированная форма для размещения на подложках

Срок годности: 3 года
Объем упаковки: 50 г (пакет); 100 г (банка)
Действующее вещество: 0,5% хлорпирифоса



Кукарача® ПРИМАНКА

От всех видов тараканов

- применяется в квартирах и других помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие насекомых
- действует по принципу «эпидемии» – насекомые, после соприкосновения с гранулами, переносят препарат на других особей, вызывая гибель всей колонии
- гибель насекомых наступает через 2–3 суток
- защищает на длительный срок
- удобная для применения форма в виде пластиковых ловушек с приманкой внутри

Срок годности: 5 лет
Объем упаковки: 1,5 г x 4 шт (контейнер)
Действующее вещество: 0,5% хлорпирифоса

НОВИНКА
2018



Кукарача® ГЕЛЬ

От тараканов, чешуйниц и мокриц

- не имеет запаха
- содержит пищевые привлекатели для насекомых
- удобный носик тубы позволяет наносить гель в труднодоступные места
- обладает продолжительным действием, благодаря длительному высыханию геля
- содержит краситель в составе для маркировки обработанных мест
- остатки препарата легко удаляются при помощи влажной ткани

Срок годности: 2 года
Объем упаковки: 30 мл (туба)
Действующее вещество: 0,5% имидаклоприда

НОВИНКА
2018



Кукарача® СПРЕЙ

От тараканов, чешуйниц и мокриц

- применяется на кухнях, в комнатах, ванных, подвалах и подсобных помещениях
- действует мгновенно: гибель насекомых наступает в течение часа
- отсутствует привыкание у насекомых

Срок годности: 2 года
Объем упаковки: 100 мл (флакон)
Действующее вещество: 0,1% альфациперметрина, 0,1% тетраметрина



Муравьед® Супер

От садовых и домовых муравьёв

- применяется на садовых участках, отмостках домов, садовых дорожках и в помещениях
- содержит пищевые добавки, привлекающие муравьёв
- проникает сквозь внешнюю оболочку муравьёв и разрушает импульсы, идущие от нервных узлов к мышцам, вызывая у насекомых паралич
- действует по принципу «эпидемии» – муравьи приносят приманку в муравейник, что вызывает гибель всей колонии
- защищает на длительный срок

Срок годности: 3 года
 Объём упаковки: 50 г (пакет); 120 г, 240 г (банка)
 Действующее вещество: 0,5% хлорпирифоса



Муравьед® Супер

ПРИМАНКА

От рыжих домовых и садовых муравьёв

- применяется в местах скопления насекомых
- содержит пищевые добавки, привлекающие муравьёв
- действует по принципу «эпидемии» – муравьи приносят приманку в муравейник, что вызывает гибель всей колонии
- насекомые гибнут на 1–3 сутки
- защищает на длительный срок
- удобная для применения форма в виде пластиковых ловушек с приманкой внутри

Срок годности: 5 лет
 Объём упаковки: 1,5 г х 4 шт (контейнер)
 Действующее вещество: 0,5% хлорпирифоса

Муравьед® ГЕЛЬ

От всех видов садовых и домовых муравьёв

- не имеет запаха
- содержит пищевые привлекатели для муравьёв
- удобный носик тубы позволяет наносить гель в труднодоступные места
- обладает продолжительным действием, благодаря длительному высыханию геля
- содержит краситель в составе для маркировки обработанных мест
- остатки препарата легко удаляются при помощи влажной ткани

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 30 мл (туба)
 Действующее вещество: 0,5% имидаклоприда

НОВИНКА 2018



НОВИНКА 2018



Осоед® ГЕЛЬ

От ос и различных видов мух

- не имеет запаха
- содержит пищевые привлекатели для насекомых
- удобный носик тубы позволяет наносить гель в труднодоступные места
- обладает продолжительным действием, благодаря длительному высыханию геля
- содержит краситель в составе для маркировки обработанных мест
- остатки препарата легко удаляются при помощи влажной ткани

Срок годности: 2 года
 Объём упаковки: 30 мл (туба)
 Действующее вещество: 0,5% имидаклоприда

Мухоед® Супер

От всех видов мух

- применяется для уничтожения мух в помещениях, таких как летние кухни, террасы, беседки и др., а также на фермах
- насекомые погибают в течение нескольких минут после контакта со средством
- содержит пищевые добавки, привлекающие насекомых
- можно использовать в виде пасты для обработки оконных рам и плафонов

Срок годности: 3 года
Объём упаковки: 10 г (пакет); 80 г (банка)
Действующее вещество: 0,4% азаметифоса



НОВИНКА
2018



Мухоед® Супер

ЛИПКАЯ ЛЕНТА

От всех видов мух

- безопасное средство для любых помещений
- работает до двух месяцев
- обладает длительным фиксирующим свойством

Срок годности: 5 лет
Объём упаковки: 1 лента в гильзе, 100 шт. в коробке
Действующее вещество: клеевая композиция

Insecta® АЭРОЗОЛЬ

Для уничтожения летающих и ползающих насекомых

- удобная форма в виде аэрозоля
- обладает мгновенным действием
- не оставляет пятен на коврах и мебели
- действует на широкий спектр вредителей, таких как тараканы, муравьи, блохи, клопы, мухи, бабочки моли, сверчки, мокрицы, уховёртки, чешуйницы

Срок годности: 3 года
Объём упаковки: 150 мл (флакон)
Действующее вещество: 0,25% циперметрина, 0,12% тетраметрина

НОВИНКА
2018



														
Клещевит® Супер КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ			✓											
Клещевит® Супер СПРЕЙ	✓		✓											
Клопоед® ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ	✓			✓	✓	✓	✓							✓
Комароед® КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ					✓									
Кукарача® ГРУНУЛЫ		✓						✓						✓
Кукарача® ПРИМАНКА									✓					✓
Кукарача® ГЕЛЬ		✓						✓						✓
Кукарача® СПРЕЙ	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Муравьед® Супер ГРУНУЛЫ						✓								
Муравьед® Супер ПРИМАНКА						✓								
Муравьед® Супер ГЕЛЬ						✓								
Мухоед® Супер ГРАНУЛЫ							✓							
Мухоед® Супер ЛИПКАЯ ЛЕНТА							✓							
Осоед® ГЕЛЬ							✓						✓	
Insecta® АЭРОЗОЛЬ	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Серия «Августина»

для декоративных
кустарников
и цветочных
культур

Серия «Августина» разработана для профилактики, лечения и комплексного ухода за садовыми, комнатными растениями, цветочной рассадой, декоративными кустарниками и включает в себя самые современные, эффективные и безопасные средства:

- для защиты растений от вредителей и болезней
- для повышения иммунитета и жизнестойкости
- удобрения с микроэлементами



Серия «Августина» удостоена медали
XX Юбилейной Международной выставки «Цветы/Flowers-IPM-2013»

«Августина» – с нами легче сделать мир вокруг цветущим!

www.avgustina.com

Августина®

для обильного цветения
и улучшения декоративности

Водорастворимое комплексное бесхлорное удобрение
с микроэлементами для подкормки цветочно-декоративных культур
в комнате, на балконе и даче

- быстро восстанавливает баланс макро- и микроэлементов, так как полностью растворяется в воде и хорошо усваивается растениями
- обеспечивает развитие мощных растений с множеством крепких побегов
- способствует продолжительному и обильному цветению
- улучшает декоративные качества

Срок годности	3 года
Объём упаковки	30 г (пакет)
Действующее вещество	N – 11%; P – 11%; K – 21%; Mg – 2,5% + микроэлементы

КУЛЬТУРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Внесение под основную обработку почвы весной или осенью	30-50 г/1 м²	равномерно распределить по поверхности почвы, заделать в почву и обильно полить	1
	Корневая подкормка растений через 7-10 дней после посадки (или появления всходов), далее – с интервалом 10-15 дней	15-20 г/1 м²	равномерно распределить по поверхности почвы, заделать в почву и обильно полить	3-4
	Корневая подкормка многолетних растений весной в начале возобновления вегетации, далее – с интервалом 10-15 дней	15-20 г/1 м²	равномерно распределить по поверхности почвы, заделать в почву и обильно полить	3-4
	Подкормка растений через 7-10 дней после посадки (или появления всходов) и далее – с интервалом 10-15 дней	2 г/1 л воды	5-10 л/1 м² (корневая подкормка); 1,5-3 л/10 м² (некорневая подкормка)	3-4
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (горшечные)	Подкормка растений	2 г/1 л воды	до увлажнения земляного кома (корневая подкормка); до увлажнения поверхности листьев (некорневая подкормка)	1 раз/7-10 дней (март – октябрь), 1 раз/месяц (ноябрь – февраль)

Примечание: 15-20 г удобрения соответствуют 1 столовой ложке



Августина®

от комплекса болезней на розах и гортензиях

Современное средство для защиты цветочных и декоративных культур от комплекса болезней

- оказывает лечебное и длительное профилактическое действия
- сдерживает развитие болезней даже после проявления их симптомов
- не смывается дождем уже через два часа после опрыскивания

Срок годности	3 года
Объём упаковки	1 мл (ампула в пакете)
Действующее вещество	250 г/л дифеноконазола, КЭ

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНИ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	2 мл/5 л воды	5 л/100 м²	2
	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	4 мл/5 л воды	5 л/100 м²	2
	Пятнистости	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	4 мл/5 л воды	5 л/100 м²	4
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	2 мл/10 л воды	10 л/100 м²	2
	Пятнистости	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 14 дней	4 мл/10 л воды	10 л/100 м²	4



Августина®

от тли, цикадок, трипсов на розах

Препарат нового поколения, обладающий высокой безопасностью для человека и других теплокровных

- обеспечивает полную защиту всех частей растений и позволяет предотвратить развитие новых поколений вредителей
- не вызывает привыкания у насекомых, гарантируя 100% результат
- не смывается дождем и устойчив к высоким температурам

Срок годности	4 года
Объём упаковки	2,5 мл (ампула в пакете)
Действующее вещество	200 г/л имидаклоприда, ВРК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ защищенного грунта	Тли, цикадки, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	2,5 мл/5 л воды	5 л/50 м²	1



Августина®

От различных видов гусениц на розах

Уникальный препарат от гусениц на цветочных и декоративных культурах

- нарушает развитие яиц и личинок насекомых
- имеет длительное последствие
- практически безопасен для полезной энтомофауны

Срок годности 3 года
Объём упаковки 2,5 мл (ампула в пакете)
Действующее вещество 240 г/л дифлубензурана, ВСК

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Агатова совка, совка-гамма, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	2,5 мл/5 л воды	1 л/20 м²	1
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Пяденицы, бражник, боярышница	Опрыскивание в период вегетации	2,5 мл/2,5 л воды	0,5-1,0 л/куст	1



Августина®

от клещей, листоедов и других вредителей на гортензиях и розах

Проверенное временем средство для защиты цветочных культур и декоративных кустарников от комплекса вредителей

- обладает высокой начальной скоростью воздействия: гибель вредителей наступает в течение 2-х часов
- уничтожает широкий спектр трудноистребимых насекомых (аналог фуфанона)
- не фитотоксичен в рекомендуемых дозах

Срок годности 2 года
Объём упаковки 2,5 мл (ампула в пакете)
Действующее вещество 570 г/л малатиона, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ	Боярышница, тли, листоеды, пилильщики, ложнощитовки, щитовки, паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации	1 мл/1 л воды	0,5-1 л/куст	2
ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Табачный трипс, тли, клопы, совки, паутинные клещи, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации	1 мл/1 л воды	1 л/20 м²	2



Августина®

биостимулятор роста и развития орхидей

Природный регулятор роста, обладающий иммуностимулирующей и антистрессовой активностью

- улучшает приживаемость при пересадке
- активирует переход к цветению, корнеобразование и росту орхидей
- обеспечивает яркое и продолжительное цветение орхидей
- повышает устойчивость к болезням, вредителям и стрессовым ситуациям

Срок годности	не ограничен, гарантийный – 2 года
Объём упаковки	3 г x 2 таблетки (пакет)
Действующее вещество	166,7 г/кг хитозана

КУЛЬТУРА	НАЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА
ОРХИДЕИ	Применяется для устранения симптомов стресса при пересадке растений, для активации роста корневой системы и надземной части, для увеличения количества цветков и продолжительного цветения	Регулярный полив растений с интервалом 14 дней, в зимнее время – с интервалом не менее 30 дней	1 таблетка/ 1,5 л воды	раствор используют в том же объеме, что и воду для полива субстрата
		Регулярный полив растений методом погружения с интервалом 14 дней, в зимнее время – с интервалом не менее 30 дней	1 таблетка/ 1,5 л воды	погружение горшка с корневой системой в рабочий раствор с последующим стеканием излишков раствора
		Регулярное опрыскивание растений с интервалом 14 дней, в зимнее время – с интервалом не менее 30 дней	1 таблетка/ 2 л воды	до полного смачивания листьев, избегая попадания на цветки

Примечание: рекомендуется чередовать полив и опрыскивание



Августина®

для продолжительного питания растений

Комплексное удобрение длительного действия с микроэлементами для цветочно-декоративных культур открытого и защищенного грунта и комнатных цветов

- однократное внесение в почву обеспечивает сбалансированное питание растений на весь сезон
- гарантирует непрерывное поступление питательных веществ
- повышает качество и количество цветков, увеличивает длительность цветения

Срок годности	5 лет
Объём упаковки	2 x 4 г (пакетик)
Действующее вещество	N – 12%, P – 8%, K – 18%, Mg – 2,5% + микроэлементы

КУЛЬТУРА	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (однолетние)	Внесение в почву при высадке рассады или в подкормку	10 г/растение (размещают рядом с растением или на дне в лунки глубиной не менее 7-10 см)	1
ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (многолетние), ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (деревья и кустарники)	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации	20-100 г/растение (размещаютна рядом с растением или на дне в лунки/ на дренаже, вокруг растений на расстоянии 15-20 см от стволов деревьев и кустарников)	1
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (горшечные)	Внесение при посадке	10 г/растение (размещают на дренаже)	1



Августина®

от клещей и тли на комнатных растениях

Биологический препарат для борьбы с клещами на комнатных растениях и цветочных культурах

- не вызывает привыкания у насекомых-вредителей
- обладает высокой скоростью воздействия
- не фитотоксичен в рекомендуемых нормах

Срок годности	2 года
Объём упаковки	7 x 1 мл (ампулы в картонном блистере)
Действующее вещество	2 г/л аверсектина С, КЭ

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА	КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	Паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей	1 мл/0,5 л воды	0,1 л/1 м²	4
	Тли	Опрыскивание по мере появления вредителей	1 мл/0,125 л воды	0,1 л/1 м²	4
	Трипсы	Опрыскивание по мере появления вредителей	1 мл/0,1 л воды	0,1 л/1 м²	4
ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	2 мл/1 л воды	до 1 л/10 м²	3
	Зеленая розанная тля	Опрыскивание в период вегетации	4 мл/1 л воды	до 1 л/10 м²	3
	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации	8 мл/1 л воды	до 1 л/10 м²	3
ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей	2 мл/1 л воды	1 л/10 м²	4
	Тли	Опрыскивание по мере появления вредителей	8 мл/1 л воды	1 л/10 м²	4
	Трипсы	Опрыскивание по мере появления вредителей	10 мл/1 л воды	1 л/10 м²	4

Поедают картофель?



Проблема:
**колорадский жук
и проволочник**



Табу®

**Протравитель клубней
картофеля
перед посадкой
против вредителей**

- применяется путём опрыскивания клубней или подготовленной борозды
- при поедании клубней или ботвы насекомые прекращают питаться и погибают в течение суток
- обладает высокой эффективностью независимо от погодных условий
- экономичный расход: 10 мл на 125 кг картофеля



Многоканальный телефон справочной службы
(бесплатно по России): **8-800-700-03-57**

Офис: 129515, Россия, г. Москва, ул. Цандера, д. 6,
тел./факс: (495) 787-84-99.

Склад: 140053, Московская область, Люберецкий район,
г. Котельники, микрорайон Силикат, промзона, стр. 4,
тел.: (495) 647-07-49.

www.avgust.com