



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 3994 от « 2 » марта 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958

(наименование регистрата, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Бордоская жидкость, ВСК (172 г/л меди сульфата  
(наименование пестицида или агрохимиката)  
трехосновного)

получил государственную регистрацию за № 021-02-3994-1

на срок по « 1 » марта 2033 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.

№ 004459

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, сроки, особенности применения пестицида	Срок ожидания, (кратность обработок)
1	2	3	4	5
250 мл/10 л воды	Яблоня, груша	Парша, монилиоз	Ранневесеннеे опрыскивание в фазе «зеленого конуса». Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	60(1)
	Слива, вишня, черешня, абрикос, алыча	Клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз		
	Слива	«Кармашки» слив		
100 мл/10 л воды	Смородина черная, крыжовник	Септориоз, антракноз, ржавчина столбчатая	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зеленого конуса». Расход рабочей жидкости – 1-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	38(3)
	Яблоня, груша	Парша, монилиоз	Опрыскивание по вегетации: первое – после цветения; последующие – с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	
	Слива, вишня, черешня, абрикос, алыча	Клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз	28(3)	
	Слива	«Кармашки» слив		
	Смородина черная	Септориоз, антракноз, ржавчина столбчатая	Опрыскивание по вегетации: первое – после цветения; последующие – с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости – 1-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	20(3)
	Крыжовник			

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения ручных работ – 1 день.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в сельскохозяйственном производстве.

